Zwiebeln

Saat | Peitsche | 1 Laubblatt | 4-Blatt | 6-Blatt | 8–10-Blatt | Bulbenbildung 21.6. | Abreife | Ernte

Unkrautregulierung

Vorsaat	**Roundup PowerMax** 4 l/ha	Bei genügend Sonnenschein 1 Tag vor Zwiebelsaat gegen Problemunkräuter. Gut mischbar mit dem Bodenverbesserer Triagol 2,5 l/ha.
Vorauflauf	**Sitradol Tec** 1,5–2,5 l/ha	Sitradol Tec im Nachauflauf in Mischung mit Bandur 0,3–0,5 l/ha. Auf leichten Böden max. 1 l/ha Sitradol Tec.
	Natrel 16 l/ha	Zum Abbrennen von Unkräutern vor dem Auflaufen der Kulturpflanzen.
Früher Nachauflauf	**Natrel** 8–10 l/ha	
Nachauflauf	**Golaprex Basic** 3 l/ha	Im jungen Stadium (1–3-Blatt) der Unkräuter.
Ab 2. Laubblatt	**Rapper** 83 g/ha	Wartefrist: 6 Wochen.
	Starane Max 0,12–0,18 l/ha	Wartefrist: 90 Tage.
	Aufwandmenge der Grösse der Zwiebeln anpassen; im 2–3-Blatt-Stadium 0,12 l/ha + 0,2 l/ha Bandur, ab 4-Blatt-Stadium 0,18 l/ha + 0,3 l/ha Bandur.	
Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten. **Select** 0,5–1 l/ha **+ Zofal R** 1 l/ha	
	Xenturion 1–3 l/ha	

Schutz vor Krankheiten

Mehlkrankheit, Blattbotrytis	**Avatar** 1 kg/ha	Wartefrist: 14 Tage.
	Mehlkrankheit: Bei Winterzwiebeln im Frühjahr; bei Sommezwiebeln ab 2-Blatt-Stadium. Behandlung nach 3 Wochen wiederholen. Botrytis: bei Befallsbeginn.	
Falscher Mehltau und Pflanzenstimulation	**Amistar** 1 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
	Vorbeugend, im jungen Stadium einsetzen, max. 3 × pro Saison. Pflanzenstimulierende Wirkung.	
Samtflecken, Purpurflecken	Max. 4 × pro Saison. **Slick** 0,5 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
Blattbotrytis, Zwiebelhalsfäule	1 Behandlung Anfang Juli. Für weitere Behandlungen Produkte wechseln. **Frupica SC** 1 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
Falscher Mehltau	**Fandango** 1,25 l/ha	
	Während dem Hauptwachstum einsetzen. Nicht mit EC-haltigen Produkten mischen. Max. 3 × pro Saison.	Wartefrist: 21 Tage.

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra oder Vapi Clean.

Wichtige Hinweise

- **Stopbehandlungen gegen Falschen Mehltau bei starkem Infektionsdruck:**
  Fandango 1,25 l/ha + Zignal 0,4 l/ha, nach 3 Tagen wiederholen!

Zwiebeln

Saat	Peitsche	1 Laubblatt	4 Blatt	6 Blatt	8–10 Blatt	Bulbenbildung 21.6.	Abreife	Ernte

Schutz vor Krankheiten (Fortsetzung)

Alternaria-Purpurflecken, Falscher Mehltau der Zwiebel, Rost auf Zwiebel-Arten, Samtfleckenkrankheit

Zignal 0,5 l/ha — Wartefrist: 7 Tage.

Bei hohem Befallsdruck zur verstärkenden Wirkung von teilsystemsichen Produkten. Kontaktfungizid mit guter Regenfestigkeit; Teilwirkung Botrytis.

Schutz vor Schädlingen

Blattläuse, Thrips, Minierfliege

Anfang Saison bei kühler Witterung einsetzen.

TAK 50 EG 0,2 kg/ha — Wartefrist: 21 Tage.

Deltastar 0,3 l/ha — Wartefrist: 14 Tage.

Thrips

Dank systemischer Wirkung sehr gut während Hauptwachstum.

Gazelle SG 0,5 kg/ha — Wartefrist: 7 Tage.

Elvis 0,4 l/ha — Wartefrist: 7 Tage.

Wachstumsregulierung

Keimhemmung

Hemmt die Keimung der behandelten Zwiebeln im Lager. Einsatz mit 500 Liter Wasser/ha ab Beginn des Knickens der Schlotten, 10–30 % der Pflanzen geknickt.

Germstop 3,75–4 kg/ha

Wartefrist: 14 Tage.

Ernährungsoptimierung

Pflanzen- und Bodenaktivator

Triagol 2,5 l/ha

Stimuliert die Pflanzen über das Blatt und den Boden. Steigert die Verfügbarkeit und Aufnahme der wichtigsten Spuren- und Hauptnährstoffe. Ideal kombinierbar mit unseren Fungiziden und Insektiziden. Als letztes Produkt in den Tank einfüllen.

In Mischung mit den ersten Fungizidspritzungen. Beschleunigt eine zügige und gleichmässige Bulbenbildung.

Goëmar Start 2 l/ha

Blattgesundheit.

Green On Micro 0,5 kg/ha

Goëmar Opti 2,5 l/ha — Mn-Versorgung

Netzmittel

Sticker 0,15 l/ha

Als Mischpartner für alle Fungizid- und Insektizidmassnahmen. Für eine bessere Benetzung der Zwiebelschlotten, erhöht den «Kleb»-Effekt der Pflanzenschutzmittel auf der Blattfläche. Bei heisser Witterung verzögert Sticker die Antrocknung und Verdunstung der Spritzbrühe. Sticker als letztes Produkt beigeben.

Schwefelversorgung, Vergrämung, Thrips

Sulfo S 3–5 l/ha