



Zwiebeln

Saat Peitsche 1 Laubblatt 4-Blatt 6-Blatt 8–10-Blatt **Bulbenbildung 21.6.** Abreife Ernte

Unkrautregulierung

Vorsaat	Roundup PowerMax 4 l/ha	Bei genügend Sonnenschein 1 Tag vor Zwiebelsaat gegen Problemunkräuter. Gut mischbar mit dem Bodenverbesserer Triagol 2,5 l/ha.
Vorauflauf	Sitradol Tec 1,5–2,5 l/ha	Sitradol Tec im Nachauflauf in Mischung mit Bandur 0,3–0,5 l/ha. Auf leichten Böden max. 1 l/ha Sitradol Tec.
	Natrel 16 l/ha	Zum Abbrennen von Unkräutern vor dem Auflaufen der Kulturpflanzen.
Früher Nachauflauf	Natrel 8–10 l/ha	
Nachauflauf	Golaprex Basic 3 l/ha	Im jungen Stadium (1–3-Blatt) der Unkräuter.
Ab 2. Laubblatt	Rapper 83 g/ha	Wartefrist: 6 Wochen.
	Starane Max 0,12–0,18 l/ha	Wartefrist: 90 Tage.
	Aufwandmenge der Grösse der Zwiebeln anpassen; im 2–3-Blatt-Stadium 0,12 l/ha + 0,2 l/ha Bandur, ab 4-Blatt-Stadium 0,18 l/ha + 0,3 l/ha Bandur.	
Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Select 0,5–1 l/ha + Zofal R 1 l/ha	
	Xenturion 1–3 l/ha	

Schutz vor Krankheiten

Mehlkrankheit, Blattbotrytis	Avatar 1 kg/ha	Wartefrist: 14 Tage.
	Mehlkrankheit: Bei Winterzwiebeln im Frühjahr; bei Sommerzwiebeln ab 2-Blatt-Stadium. Behandlung nach 3 Wochen wiederholen. Botrytis: bei Befallsbeginn.	
Falscher Mehltau und Pflanzenstimulation	Amistar 1 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
	Vorbeugend, im jungen Stadium einsetzen, max. 3 × pro Saison. Pflanzenstimulierende Wirkung.	
Samtflecken, Purpurflecken	Slick 0,5 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
Blattbotrytis, Zwiebelhalsfäule	1 Behandlung Anfang Juli. Für weitere Behandlungen Produkte wechseln. Frupica SC 1 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
Falscher Mehltau	Fandango 1,25 l/ha	Wartefrist: 21 Tage.
	Während dem Hauptwachstum einsetzen. Nicht mit EC-haltigen Produkten mischen. Max. 3 × pro Saison.	

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra oder Vapi Clean.

Wichtige Hinweise

- **Stopbehandlungen gegen Falschen Mehltau bei starkem Infektionsdruck:**
Fandango 1,25 l/ha + Signal 0,4 l/ha, nach 3 Tagen wiederholen!