Apfel

Austrieb | Vorblüte | Blüte | Nachblüte | Triebabschluss | Ernte

Schutz vor Krankheiten

Schorf

Kontaktwirkstoffe, nur vorbeugende Wirkung

Kocide 2000 2–4 kg/ha oder **Oxykupfer 35** 2 kg/ha — Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. ÖLN: max. 1,5 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr.

Kocide 2000 1–2 kg/ha oder **Oxykupfer 35** 1–2 kg/ha

Bordeaux S 2–8 kg/ha — Austrieb: 4–8 kg/ha; Vorblüte: 2–4 kg/ha

Cupric Flow 4–8 l/ha — Austrieb: 4–8 l/ha; Vorblüte: 2–4 l/ha

Venturex 1,2 l/ha

Atollan 0,8 kg/ha — Alle 6–8 Tage. Bis Ende Juni.

Behandlungen nach der Blüte: pro Parzelle und Jahr insgesamt nicht mehr als 4,85 kg/ha Atollan.

Max. 10 × / Jahr.

Captan S WG 2,4 kg/ha — Wartefrist 3 Wochen.

Folpet 80 WDG 2 kg/ha — Wartefrist 3 Wochen.

Stamina S 3,2 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha — oder Captan S WG 1,6 kg/ha oder Folpet 80 WDG 1,4 kg/ha

1–2 Behandlungen vor / 2–4 Behandlungen nach der Blüte. Max. 6 Behandlungen/Jahr.
Stamina S (Solobehandlung): 2 l/ha; Wartefrist 2 Wochen.

Schorf, Echter Mehltau

Max. 3 Behandlungen im Jahr

Tofa 0,21 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha — oder Captan S WG 1,6 kg/ha

Wartefrist 5 Wochen.

Abstoppende Wirkung

Frupica SC 0,32 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha — oder Captan S WG 1,6 kg/ha

2–3 Tage abstoppend nach Infektion. Max. 3 Behandlungen/Jahr.

Schorf, Echter Mehltau

Abstoppende Wirkung
3–4 Tage abstoppend nach Infektion.
Max. 4 Behandlungen/Jahr.

Slick 0,24 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha oder **Captan S WG** 1,6 kg/ha — Atollan bis Ende Juni, Slick bis Ende Juli.

Mischpartner

gemeinsam mit Schorfbekämpfung

Echter Mehltau

Cyflamid 0,5 l/ha oder **Tofa** 0,21 l/ha

Mit ausgeprägter Dampfphase, welche den Wirkungsgrad erhöht.
Max. 2 Behandlungen/Jahr.

Wartefrist 3 Wochen.

Echter Mehltau und Teilwirkung Schorf

Sufralo 2 kg/ha | **Sufralo** 8–12 kg/ha | **Sufralo** 4,8–8 kg/ha

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha).

Apfel

Austrieb | Vorblüte | Blüte | Nachblüte | Triebabschluss | Ernte

Spezialbehandlungen

Feuerbrand	**Vacciplant** 0,75 l/ha — Teilwirkung. Ab Grünknospenstadium mit jeder Spritzung behandeln.
	Gegen Sekundärinfektionen (Teilwirkung). 1. Behandlung bei 3–5 cm langen Trieben. 2. Behandlung 3–5 Wochen später. **Regalis Plus** 2,5 kg/ha/Jahr Bei einmaliger Behandlung: Max. 2,5 kg/ha zwischen Blühbeginn und Ende der Blüte oder max. 1,5 kg/ha zwischen Nachblütefruchtfall und dem Erreichen von 50 % der sortentypischen Fruchtgrösse.
Hemmung des Triebwachstums	**Regalis Plus** 2,5 kg/ha/Jahr Splitbehandlungen möglich. Maximale Aufwandmenge pro Parzelle und Jahr: 2,5 kg/ha. Je nach Wasserqualität mit X-Change 0,1–0,2 % mischen.
	Max. 3 Behandlungen/Jahr. **Frupica SC** 0,48 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha oder **Captan S WG** 1,6 kg/ha
Teilwirkung Schorf und Echter Mehltau	**Armicarb** 0,2–0,3 % (3–4,8 kg/ha) + **Sufralo** 0,2 % (3,2 kg/ha) Teilwirkung gegen Lagerschorf und Regenfleckenkrankheit. Bei hohen Temperaturen nur 3 kg/ha Armicarb. Wartefrist: 8 Tage.
Lagerkrankheiten	Vorbeugend alle 10–14 Tage. **Captan S WG** 2,4 kg/ha Wartefrist: 3 Wochen.
	Folpet 80 WDG 2 kg/ha Wartefrist: 3 Wochen.
Echter Mehltau, Schorf und Lentizellenfäulnis	Teilwirkung. **Vacciplant** 1 l/ha Wartefrist: 3 Tage.

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha). Baumvolumenkonzept auf der Website www.staehler.ch.