Apfel

	Austrieb	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Triebabschluss	Ernte

Schutz vor Schädlingen

Austernschildläuse, Frostspanner, Gallmilben, Napfschildläuse, Rote Spinne	**Zofal D** 56 l/ha	Stadium B–C.	oder Zofal R 2 % 30–40 l/ha.	Ab 10 °C, nicht bei Frostgefahr. Mischbar mit Oxykupfer, Kocide 2000. Aufwandmenge mit Gun 2,5–3,5 l/100 l Wasser (2,5–3,5 %). Nicht mischbar mit Atollan.		
Rote Spinne		**Zofal D** 32 l/ha	Stadium D.			
		Zofal D 16 l/ha	Stadium E.			
Apfelblütenstecher	**Gazelle SG** 0,32 kg/ha	Stadium B–C. Gazelle SG: max. 2 Behandlungen/Kultur/Jahr.				
	Elvis 0,32 l/ha					
Blattläuse (Röhrenläuse)	**Gazelle SG** 240 g/ha			**Gazelle SG** 240 g/ha	160 g/ha	
	Aufwandmengen: Vor oder nach der Blüte 240 g/ha. Ab Juli 160 g/ha. Max. 1 Behandlung/Jahr auf dieselbe Blattlausart, max. 2 Behandlungen/Kultur/Jahr.					
Blattläuse (Röhrenläuse) und (Teilwirkung) Kommaschildlaus	ÖLN: 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr. Zur Wirkungssteigerung + Sticker 0,15 l/ha.			**Pirimor** 640 g/ha	320 g/ha	
Blutlaus-Strategie mit Homöopathie unterstützt	3 Behandlungen im Abstand von jeweils 3 Tagen. Danach Folgebehandlung mit Pirimor.		**Vitex Blutlaus** 1 l/ha + **Vitex Plus** 1 l/ha			
				Pirimor 640 g/ha		
Frostspanner, Eulenraupen		**Atac** 0,2 % 3,2 kg/ha	oder Elvis 0,32 l/ha			
Frostspanner, Gespinstmotte und Schalenwickler		**Wormox** 0,8–1 kg/ha		**Wormox** 0,8–1 kg/ha		
Apfelwickler, Schalenwickler und kleiner Fruchtwickler		**Atac** 3,2 kg/ha		**Atac** 3,2 kg/ha	**Atac** 3,2 kg/ha	
		Nur in Obstanlagen.		Max 2. Behandlungen. Wartefrist: 3 Wochen.		
		Elvis 0,32 l/ha		**Elvis** 0,32 l/ha	**Elvis** 0,32 l/ha	
Fruchtwanzen		**Elvis** 0,32 l/ha		**Elvis** 0,32 l/ha		

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha).

Apfel

Austrieb	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Triebabschluss	Ernte

Schutz vor Schädlingen

Rote Spinnen	**Nissostar** 0,32 l/ha Wintereier vor der Blüte; Sommereier ca. 14 Tage nach dem Abblühen, spätestens bis 30. Juni. Max. 1 × pro Jahr.	
	Gegen mobile Stadien; sofort oder ca. 3 Wochen nach der Blüte. Auf gute Benetzung achten und Sticker 0,15 l/ha zusetzen.	**Kanemite** 1,8 l/ha
Rostmilben (Teilwirkung)	12 kg/ha **Sufralo** 8 kg/ha ÖLN: 4–5 Anwendungen/Jahr mit 4–5 kg/ha.	**Sufralo** 4,8–8 kg/ha
Blattläuse und Spinnmilben	**Oleate 20** 10–15 l/ha	**Oleate 20** 10–15 l/ha Wartefrist 3 Wochen.
Mehlige Apfelblattlaus (Apfel)	**Sicid Neem** 1,5 l/ha	**Sicid Neem** 1,5 l/ha Bis Ende Mai
Äpfelsägewespe	Beim Abblühen. Gazelle SG: max. 2 Behandlungen/Kultur/Jahr.	**Gazelle SG** 240 g/ha
Apfelwickler Verwirrung	**CheckMate** Dispenser Arbo CM-XL 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha Montage Mitte April. Anzahl Dispenser oder Puffer ist abhängig von der Anlagegrösse. Kontakt mit Aussendienst. Möglichst geringe Ausgangspopulation (nicht über 1–2 % Befall im Vorjahr). **CheckMate** Puffer Arbo CM 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha	
Apfelwickler und Schalenwickler Verwirrung	**CheckMate** Leaf Multi 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha	
Apfelwickler, Pfirsichwickler	Mindestens 3 Behandlungen mit je 1 l/ha. Geeignet gegen Spätbefall. Wirkungsdauer: 12 Tage. Gekühlt lagern bei ca. 5 °C. + Lufix 2 l/ha (UV-Schutz).	**Carpovirusine Evo2** 1 l/ha Wartefrist nur 1 Woche.
Unterstützung bei Wachstum und Blattgesundheit	**Vitex Plus** 1 l/ha + **Vitex Verde** 1 l/ha	

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha).