Birne

	Austrieb	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Triebabschluss	Ernte

Schutz vor Krankheiten

Schorf	**Kontaktwirkstoffe, nur vorbeugende Wirkung** **Kocide 2000** 2–4 kg/ha oder **Oxykupfer 35** 2 kg/ha — Höchstens 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. ÖLN: max. 1,5 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. **Kocide 2000** 1–2 kg/ha oder **Oxykupfer 35** 1–2 kg/ha **Bordeaux S** 2–8 kg/ha — Austrieb: 4–8 kg/ha; Vorblüte: 2–4 kg/ha. **Cupric Flow** 2–8 l/ha — Austrieb: 4–8 l/ha; Vorblüte: 2–4 l/ha. **Venturex** 1,2 l/ha **Atollan** 0,8 kg/ha — Alle 6–8 Tage. Bis Ende Juni. Behandlungen nach der Blüte: pro Parzelle und Jahr insgesamt nicht mehr als 4,85 kg/ha Atollan. Max. 10 × / Jahr. **Captan S WG** 2,4 kg/ha — Wartefrist 3 Wochen. Max. 6 Behandlungen/Jahr. **Stamina S** 3,2 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha oder Captan S WG 1,6 kg/ha 1–2 Behandlungen vor / 2–4 Behandlungen nach der Blüte. **Abstoppende Wirkung** **Frupica SC** 0,32 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha oder Captan S WG 1,6 kg/ha Max. 3 Behandlungen/Jahr. 2–3 Tage abstoppend nach Infektion / vorbeugend 6–8 Tage.
Schorf und Echter Mehltau	**Tofa** 0,21 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha oder Captan S WG 1,6 kg/ha
Schorf, Echter Mehltau, Blüten- und Zweigdürre	**Abstoppende Wirkung** Max. 4 Behandlungen/Jahr. **Slick** 0,24 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha oder **Captan S WG** 1,6 kg/ha — Atollan bis Ende Juni, Slick bis Ende Juli. 3–4 Tage abstoppend nach Infektion.

Mischpartner

gemeinsam mit Schorfbekämpfung

Echter Mehltau	Max. 2 Behandlungen/Jahr. **Cyflamid** 0,5 l/ha oder **Tofa** 0,21 l/ha Mit ausgeprägter Dampfphase, welche den Wirkungsgrad erhöht. Wartefrist 3 Wochen.
Echter Mehltau und Teilwirkung Schorf	**Sufralo** 12 kg/ha **Sufralo** 8–12 kg/ha **Sufralo** 4,8–8 kg/ha

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha).

Birne

	Austrieb	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Triebabschluss	Ernte

Spezialbehandlungen

Birnenblütenbrand	**Alial 80 WG** 4,8 kg/ha — Teilwirkung.
Feuerbrand	**Vacciplant** 0,75 l/ha — Teilwirkung. Ab Grünknospenstadium mit jeder Spritzung behandeln.
	Gegen Sekundärinfektionen. 1. Behandlung bei 3–5 cm langen Trieben. 2. Behandlung 3–5 Wochen später. **Regalis Plus** 2,5 kg/ha/Jahr Bei einmaliger Behandlung: max. 2,5 kg/ha zwischen Blühbeginn und Ender der Blüte. Max. 1,5 kg/ha zwischen Nachblütefruchtfall und dem Erreichen von 50 % der sortentypischen Fruchtgrösse. Nicht mit Ausdünnungspräparaten sowie anderen Calciumdüngern mischen. Abstand 2–3 Tage.
Hemmung des Triebwachstums	**Regalis Plus** 2,5 kg/ha/Jahr
Kelchfäule, Monilia und Schorf	Max. 3 Behandlungen/Jahr. **Frupica SC** 0,48 l/ha **+ Atollan** 0,48 kg/ha oder **Captan S WG** 1,6 kg/ha
Teilwirkung Schorf und Echter Mehltau	**Armicarb** 0,2–0,3 % (3–4,8 kg/ha) **+ Sufralo** 0,2 % (3,2 kg/ha) Teilwirkung gegen Lagerschorf und Regenfleckenkrankheit. Wartefrist: 8 Tage.
Lagerkrankheiten	Vorbeugend alle 10–14 Tage. Wartefrist 3 Wochen. 2,4 kg/ha **Captan S WG**
Echter Mehltau, Schorf	Teilwirkung. **Vacciplant** 1 l/ha Behandlungen im Abstand von 7–10 Tagen. Wartefrist 3 Tage.
Verbesserung des Fruchtansatzes bei Williamsbirnen	**Falgro Tabs** 1 Tab./100 l Wasser
Unterstützung bei Wachstum und Blattgesundheit	**Vitex Plus** 1 l/ha **+ Vitex Verde** 1 l/ha

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha).