Birne

	Austrieb	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Triebabschluss	Ernte

Schutz vor Schädlingen

Gemeiner und Kleiner Birnblattsauger	**Surround** 32 kg/ha **+ Sticker** 0,1 %				Surround bei Flugbeginn im Februar/März einsetzen, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Temperaturen über 10 °C ansteigen. Anschliessend 2–3 Behandlungen bis zur Blüte.	
	TAK 50 EG 0,48 kg/ha	TAK 50 EG im Februar/März einsetzen, wenn an zwei aufeinanderfolgenden Tagen die Temperaturen über 10 °C ansteigen. (Sonderbewilligung)				
	Ein Zusatz von Anti-Mousse reduziert die Schaumbildung.			**Armicarb** 5 kg/ha		
Austernschildläuse, Frostspanner, Gallmilben, Napfschildläuse, Rote Spinne und Birnpockenmilbe	**Zofal D** 56 l/ha	oder Zofal R 2 % 30–40 l/ha.	Stadium B–C.	Ab 10 °C, nicht bei Frostgefahr. Aufwandmenge mit Gun 2,5–3,5 l/100 l Wasser (2,5–3,5 %). Mischbar mit Cupric Flow, Kocide 2000 oder Oxykupfer 35; nicht mischbar mit Atollan.		
Rote Spinne		**Zofal D** 32 l/ha	Stadium D.			
		Zofal D 16 l/ha	Stadium E.			
Blattläuse (Röhrenläuse)		**Gazelle SG** 240 g/ha		**Gazelle SG** 240 g/ha	160 g/ha	
	Vor oder nach der Blüte. Aufwandmenge ab Juli 160 g/ha. Gazelle SG: max. 1 Behandlung/Jahr auf dieselbe Blattlausart. Max. 2 Behandlungen/Kultur/Jahr.					
Blattläuse (Röhrenläuse) und Teilwirkung Kommaschildlaus	Zur Wirkungssteigerung **+ Sticker 0,15 l/ha** Spritzung auf Junglarven der Kommaschildlaus. Maximal 2 Behandlungen pro Kultur und Jahr. ÖLN: 1 Behandlung pro Blattlausart.			**Pirimor** 640 g/ha	320 g/ha	
Frostspanner und Eulenraupen		**Atac** 0,2 % (3,2 kg/ha)	oder Elvis 0,32 l/ha	**Atac** 3,2 kg/ha		
Frostspanner, Gespinnstmotte und Schalenwickler		**Wormox** 0,8–1 kg/ha		**Wormox** 0,8–1 kg/ha		
Apfelwickler, Schalenwickler und kleiner Fruchtwickler		**Atac** 3,2 kg/ha		**Atac** 3,2 kg/ha	**Atac** 3,2 kg/ha	
		Nur in Obstanlagen.		Max 2. Behandlungen. Wartefrist: 3 Wochen.		
		Elvis 0,32 l/ha		**Elvis** 0,32 l/ha	**Elvis** 0,32 l/ha	
Fruchtwanzen		**Elvis** 0,32 l/ha		**Elvis** 0,32 l/ha		

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha).

Birne

Austrieb	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Triebabschluss	Ernte

Schutz vor Schädlingen

Rote Spinne	**Nissostar** 0,32 l/ha	**Nissostar** 0,32 l/ha — Ca. 14 Tage nach Blüte bis spätestens am 30. Juni.
	Auf Wintereier vor der Blüte, Sommereier nach dem Abblühen. Max. 1× pro Jahr.	
	Sofort oder ca. 3 Wochen nach der Blüte einsetzen. Auf mobile Stadien einsetzen. Auf gute Benetzung achten und 0,15 l/ha Sticker zusetzen.	**Kanemite** 1,8 l/ha — Maximal 1 Behandlung pro Parzelle und Jahr.
Rostmilben (Nebenwirkung)	12 kg/ha **Sufralo** 8 kg/ha	**Sufralo** 4,8–8 kg/ha
Blattläuse und Spinnmilben	**Oleate 20** 10–15 l/ha	**Oleate 20** 10–15 l/ha Wartefrist: 3 Wochen.
Birnpockenmilbe		(Nacherntebehandlung) 32 kg/ha **Sufralo**
Sägewespe	Beim Abblühen. Gazelle SG: max. 2 Behandlungen/Kultur/Jahr.	**Gazelle SG** 240 g/ha
Apfelwickler Verwirrung	**CheckMate** Dispenser Arbo CM-XL 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha Montage Mitte April. Anzahl Dispenser oder Puffer ist abhängig von der Anlagegrösse. Kontakt mit Aussendienst. Möglichst geringe Ausgangspopulation (nicht über 1–2 % Befall im Vorjahr). **CheckMate** Puffer Arbo CM 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha	
Apfelwickler und Schalenwickler Verwirrung	**CheckMate** Leaf Multi 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha	
Apfelwickler	Mindestens 3 Behandlungen mit 1 l/ha. Geeignet auch gegen Spätbefall. Wirkungsdauer: 12 Tage. Gekühlt lagern bei ca. 5 °C. + Lufix 2 l/ha (UV-Schutz).	**Carpovirusine Evo2** 1 l/ha Wartefrist: 1 Woche.

Die angegebene Aufwandmenge bezieht sich auf ein Baumvolumen von 10 000 m³ pro ha (1600 l/ha).