Kirsche/ Zwetschge

Austrieb	Vorblüte	Blüte	Nachblüte	Triebabschluss	Ernte

Schutz vor Schädlingen

Austernschildläuse, Frostspanner, Gallmilben, Napfschildläuse, Rote Spinne	**Zofal D** 56 l/ha Stadium B–C. oder Zofal R 2 % 30–40 l/ha.	Ab 10° C, nicht bei Frostgefahr. Aufwandmenge mit Gun 2,5–3,5 l/100 l Wasser (2,5–3,5 %). Mischbar mit Kocide 2000, Oxykupfer 35, Bordeaux S; nicht mischbar mit Atollan.
Rote Spinne	**Zofal D** 32 l/ha Stadium D. **Zofal D** 16 l/ha Stadium E.	
Frostspanner, Schalenwickler	**Elvis** 0,32 l/ha	**Elvis** 0,32 l/ha Nur ausserhalb der Blüte behandeln.
Frostspanner, Gespinnstmotte und Schalenwickler	**Wormox** 0,8–1 kg/ha	**Wormox** 0,8–1 kg/ha
Schwarze Kirschenlaus		**Gazelle SG** 240 g/ha Max. 2 × / Kultur/Jahr.
Kirschenfliege	2. Behandlung mit Gazelle SG im Abstand von 10 Tagen. Max. 2 × / Kultur/Jahr.	**Gazelle SG** 320 g/ha Wartefrist 14 Tage.
Kirschessigfliege	Gemäss allgemeiner Verfügung BLW / Jahr. Max. 2 × / Kultur/Jahr.	**Elvis** 0,32 l/ha oder **Gazelle SG** 240 g/ha Wartefrist: 7 Tage. Wartefrist Kirschen 7 Tage; Zwetschgen 14 Tage.
Blattläuse	**Gazelle SG** 240 g/ha Grüne Zwetschgenlaus vor der Blüte. Mehlige Zwetschgenlaus im Sommer. 1 Behandlung/Blattlausart. Max. 2 × / Kultur/Jahr.	**Gazelle SG** 240 g/ha
	Im ÖLN 1 Behandlung pro Blattlausart und Jahr.	**Pirimor** 640 g/ha / 320 g/ha Ab Juli tiefere Dosierung (320 g/ha).
Spinnmilben	**Nissostar** 0,32 l/ha Nur eine Behandlung/Jahr.	**Nissostar** 0,32 l/ha Bis Ende Juni.
Blattläuse und Spinnmilben	**Oleate 20** 10–15 l/ha	**Oleate 20** 10–15 l/ha Wartefrist 3 Wochen.
Sägewespe (Zwetschgen)		**Gazelle SG** 240 g/ha Beim Abblühen.
Pflaumenwickler (Zwetschge)	Gemäss Warndienst, nach 14 Tagen wiederholen.	**Atac** 3,2 kg/ha Max. 2 Behandlungen. Wartefrist: 3 Wochen.
Schalenwickler Verwirrung	**CheckMate** Leaf Multi 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha	