



## Salate

Pflanzung

5–6-Blatt

8-Blatt

10-Blatt

Vor der  
Kopfbildung

Kopfbildung

### Unkrautregulierung

	<b>Nizo S</b> 2,5–3,75 l/ha	Vor der Pflanzung Nizo 3,5 l/ha + Sitradol Tec 3 l/ha oder sofort nach der Pflanzung Nizo 2,5–3,75 l/ha; leicht einregnen (mind. 15 mm).
--	-----------------------------	--

### Schutz vor Krankheiten

Falscher Mehltau, Schwarzfäule und Botrytis (Teilwirkung)	<b>Amistar</b> 1 l/ha	
	In gedeckten Kulturen kein Einsatz von November bis März.	Wartefrist: 14 Tage.
Falscher Mehltau Kopfsalat, Endivien, Lattich, Chicorée	<b>Stamina S</b> 3 l/ha	
	3 Behandlungen pro Jahr im Abstand von 7–10 Tagen.	Wartefrist: 14 Tage.
Falscher Mehltau (Teilwirkung)	<b>Vacciplant</b> 1 l/ha	
	Mischbar mit Amistar.	Wartefrist: 3 Tage.
Marssonina-Blattfleckenkrankheit	<b>Slick</b> 0,5 l/ha	
	Ab Befallsbeginn, max. 4 Behandlungen. Sortenverträglichkeit beachten.	Wartefrist: 21 Tage.
Botrytis, Sclerotinia, Rhizoctonia	<b>Avatar</b> 0,6 kg/ha	1. Behandlung 3–5 Tage nach der Pflanzung. 2. Behandlung nach 10–14 Tagen wiederholen. Max. 2 Behandlungen pro Parzelle und Jahr.

### Schutz vor Schädlingen

Salatwurzellaus	Wartefrist: 6 Wochen.	<b>Pirimor</b> 0,1 % (5 g/m <sup>2</sup> )
	Gegen Wurzelläuse nur in Setzlingsproduktion im Gewächshaus. Von Juni bis August.	
Blattläuse	Wartefrist: 14 Tage.	<b>Gazelle SG</b> 0,15 kg/ha
	Wartefrist: 7 Tage.	<b>Sicid Neem</b> 1,5 l/ha
Blattläuse, Erdruppen, Minierfliegen, Thripse	Wartefrist: 7 Tage.	<b>TAK 50 EG</b> 0,2 kg/ha
Erdruppen, Eulenraupen, Thrips	Wartefrist: 7 Tage.	<b>Elvis</b> 0,2 l/ha
Erdruppen	Wartefrist: 14 Tage.	<b>Deltastar</b> 0,5 l/ha

### Ernährungsoptimierung

Innenbrand und Blattnekrosen	<b>Calshine</b> 2 × 2,5 l/ha
------------------------------	------------------------------