



Bohnen

Saat

Keimblatt

2–4-Blatt

6-Blatt

Vorblüte

Blüte

Unkrautregulierung

Voraufbehandlung	Cargon S 0,25 l/ha + Successor 600 2 l/ha	Sofort nach der Saat (spätestens 3 Tage danach) einsetzen.
	Colzaphen 3 l/ha	
Nachaufbau	Ab Keimblatt der Bohnen: 1 kg/ha Pedian SG + 1 l/ha Bolero.	Pedian SG 0,5–0,8 kg/ha
Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten.	Select 0,5–1 l/ha + Zofal R 1 l/ha
		Xenturion 1–3 l/ha

Schutz vor Krankheiten

Botrytis, Brennflecken, Sclerotinia, Falscher Mehltau	Vorbeugender Einsatz, max. 3 Behandlungen pro Jahr. Wartefrist: 14 Tage. Vorblüte bei Knospen ca. bei aufgehenden Blüten.	Amistar 1 l/ha
Bohnenbrand, Fettfleckenkrankheit	Wartefrist: 21 Tage.	Kocide 2000 2 kg/ha
Botrytis, Sclerotinia	1. Behandlung: Vollblüte.	Avatar 0,8 kg/ha
	Folgebehandlung bei grossem Infektionsdruck in die Vollblüte.	Fezan 1 l/ha Standfestigkeit.

Schutz vor Schädlingen

Erdräupen, Blattläuse	TAK 50 EG 0,2 kg/ha	Wartefrist: 7 Tage.
Leguminosen Zünsler	Deltastar 0,3 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
Blattläuse	Pirimor 0,5 kg/ha	Wartefrist: 7 Tage.
Eulenraupen	Wormox 1 kg/ha	Wartefrist: 2 Tage.

Ernährungsoptimierung

Pflanzenaktivator	Beeinflusst gleichmässigen Blüteansatz.	Goëmar Start 2 l/ha
		Vitaly 3 × 2 l/ha