



Eiweisserbsen

Nachsaat

2–4-Blatt

6-Blatt

Vorblüte

Blüte

Unkrautregulierung

Voraufbehandlung	Dacthal SC 3 l/ha + Successor 600 2l/ha oder Colzaphen 3 l/ha	Behandlung bis max. 3 Tage nach der Saat. Auf leichten, durchlässigen Böden nicht einsetzen. Saatgut muss vollständig gedeckt sein. Feuchter Boden begünstigt Wirkung.
Nachauflauf	Berone 1 l/ha + Pedian SG 1 kg/ha	Ab 2-Blatt-Stadium der Erbsen. Evtl. im Splitverfahren (2× Berone 0,5 l/ha + Pedian SG 0,5 kg/ha). Breiteste Wirkung mit Zusatz von Sitradol Tec 1 l/ha im 1. Split.
Korrekturbehandlung	Trifolin 4l/ha	Korrekturbehandlung gegen wuchsstoffempfindliche Unkräuter. Nur bei kleinem Unkraut genügend wirksam.
Gräser	Select 0,5 l/ha + Xenturion 1 l/ha	

Schutz vor Krankheiten

Brennfleckenkrankheit, Botrytis und Falscher Mehltau	Sortenanfälligkeit und Befallsgefahr beobachten. Mit Blattlausmitteln mischbar.	Amistar 1 l/ha oder Fezan 1 l/ha
--	---	--

Schutz vor Schädlingen

Schnecken	Metarex INOV 5 kg/ha oder Ironmax Pro 7 kg/ha	Je nach Witterung und Schneckenpopulation Behandlung wiederholen.
Erbsenwickler	Atac 1,5 kg/ha oder Deltastar 0,3 l/ha	
Erbsenblattrandkäfer	TAK 50 EG 0,2 kg/ha	
Blattläuse	Bei Befallsbeginn, vor der Blüte. Mischung mit Fungiziden möglich.	Pirimor 150 g/ha

Ernährungsoptimierung

Pflanzen- und Bodenaktivator	Triagol 2,5 l/ha oder Naturamin WSP 0,5 kg/ha	
Pflanzenaktivator	Goëmar Multi 3 l/ha	Zur Förderung einer gleichmässigen Blüte.
Verhindert Blütenabwurf	Vitaly 2 l/ha	