Chicorée

	Saat	Keimblatt	2-Blatt	4-Blatt	6-Blatt	10-Blatt	Kopfbildung	Treiberei
Unkrautregulierung								
Nach der Saat	**Nizo S** 2,5–3,75 l/ha		Einsatz bis kurz vor dem Auflaufen; leicht einregnen (mind. 15 mm) verbessert die Wirkung. Ungenügende Wirkung gegen Korbblütler.					
Im Nachauflauf		**Debut** 2 × 20–30 g/ha						
Schutz vor Krankheiten								
Echter Mehltau, Cladosporium			**Amistar** 1 l/ha					Wartefrist: 14 Tage.
Falscher Mehltau, Phytium	4 Behandlungen pro Jahr.		**Stamina S** 3,5 l/ha					Wartefrist: 15 Tage.
Alternaria, Echter Mehltau, Rost			**Slick** 0,5 l/ha					Wartefrist: 21 Tage.
Sclerotinia, Botrytis	Anwendung: Bei der Einlagerung 36 g/t im Sprühverfahren oder 90 g/hl als Tauchbehandlung. Vor der Treiberei im Sprühverfahren 4,5 g/m². Wartefrist: 21 Tage.							**Avatar** 1 kg/ha
Schutz vor Schädlingen								
Blattläuse, Thrips, Erdraupen, Minierfliegen			**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha					
Erdraupen		Wartefrist: 14 Tage.	**Deltastar** 0,5 l/ha					
Blattläuse			**Pirimor** 0,5 kg/ha					Wartefrist: 7 Tage.
Eulenraupen			**Wormox** 1 kg/ha					

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra oder Vapi Clean.