



Erdbeeren

Pflanzung

Austrieb

Blütenknospen
sichtbar

Vollblüte

Frucht-
entwicklung

Nach der Ernte

Unkrautregulierung

Vor oder sofort nach der Pflanzung	Successor 600 2 l/ha	Im Speziellen gegen: Kamille, Klebern, Taubnessel, Gluren und Hirsen.
Nach der Pflanzung	Aprex FL 2,5 l/ha	
Früher Nachauflauf	Beetup 160 EC 1,5–3 l/ha	2 Behandlungen im Abstand von 4–8 Tagen gegen frisch aufgelaufene breitblättrige Unkräuter. Kein Zusatz von Öl.
4 Wochen nach der Pflanzung	Devrinol Plus 3–3,5 l/ha	Anschließend 5 mm beregnen. Nicht auf Sand- und Moorböden einsetzen.
Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Select 0,5–1 l/ha + Zofal R 1 l/ha	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten. Anwendung bis vor der Blüte oder nach der Ernte.
	Xenturion 1–3 l/ha	
		Select 0,5–1 l/ha
		Xenturion 1–3 l/ha
Vor der Blüte oder nach der Ernte	Rapper 167 g/ha	Rapper 167 g/ha
	Max. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.	

Schutz vor Krankheiten

Rote Wurzelfäule und Rhizomfäule	Alial 80 WG 5 kg/ha	Im Giess- oder Spritzverfahren über die Pflanzen. Herbst: vorbeugende Behandlung Ende August bis Mitte September (wüchsiges Wetter). Vegetationsbeginn: Einsatz vor Blütebeginn. Max. 4 Behandlungen.	dito
	Max. 3 Behandlungen.	Stamina S 5 l/ha	Giessbehandlung vor der Blüte oder nach der Ernte. Stamina S 5 l/ha
Echter Mehltau	Armicarb 3 kg/ha		Wartefrist: 3 Tage.
	Regelmässige Behandlung im Abstand von 8 Tagen. Für den biologischen Land- und Gartenbau zugelassen.		
	Slick 0,5 l/ha		Wartefrist: 3 Wochen.
	Sufralo 2–4 kg/ha		
Echter Mehltau und Teilwirkung Botrytis	Vacciplant 1 l/ha		Wartefrist: 0 Tage.
Echter Mehltau, Blattflecken, gute Teilwirkung Botrytis	Max. 3 Behandlungen.	Amistar 1 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.



Erdbeeren

Pflanzung Austrieb Blütenknospen sichtbar Vollblüte Fruchtentwicklung Nach der Ernte

Schutz vor Krankheiten (Fortsetzung)

Spritzreinigung mit All Clear Extra oder Vapi Clean.

Graufäule/Botrytis	Max. 1 Behandlung.	Frupica SC 1 l/ha	Wartefrist: 14 Tage.
	Max. 2 Behandlungen.	Avatar 1 kg/ha	Wartefrist: 14 Tage.
Blattfleckenkrankheit		Kocide 2000 1,5–4 kg/ha	dito
Blattflecken Teilwirkung Eckige Blattfleckenkrankheit		oder Oxykupfer 35 1,5 kg/ha	dito
		Bordeaux S 2,5–7,5 kg/ha	
		Cupric Flow 3,5–7,5 l/ha	
Lederfäule Teilwirkung	Max. 3 Behandlungen.	Stamina S 5 l/ha	Wartefrist: 21 Tage.

Schutz vor Schädlingen

Erdbeerblütenstecher, Thrips	Nicht ÖLN.	TAK 50 EG 0,2 kg/ha	Wartefrist: 21 Tage.
	oder	Elvis 0,2 l/ha	Wartefrist: 3 Tage.
Blattläuse und Spinnmilben		Oleate 20 10 l/ha	Wartefrist: 7 Tage.
Eulenraupen		Wormox 1 kg/ha	
Blattläuse		Pirimor 0,4 kg/ha	Wartefrist: 21 Tage.
Spinnmilben		Nissostar 0,4 l/ha	dito
Kirschfliege		Elvis 0,2 l/ha	Wartefrist: 3 Tage.
Schnecken	Zur Sicherung der Ernte vor Frassschäden. Behandlungen evtl. mehrmals wiederholen.	Metarex INOV 5 kg/ha	
Biologisches Schneckenkorn		Ironmax Pro 7 kg/ha	