Erdbeeren

	Pflanzung	Austrieb	Blütenknospen sichtbar	Vollblüte	Frucht-entwicklung	Nach der Ernte

Unkrautregulierung

Vor oder sofort nach der Pflanzung	**Successor 600** 2 l/ha	Im Speziellen gegen: Kamille, Klebern, Taubnessel, Gluren und Hirsen.
Nach der Pflanzung	**Aprex FL** 2,5 l/ha	
Früher Nachauflauf	**Beetup 160 EC** 1,5–3 l/ha	2 Behandlungen im Abstand von 4–8 Tagen gegen frisch aufgelaufene breitblättrige Unkräuter. Kein Zusatz von Öl.
4 Wochen nach der Pflanzung	**Devrinol Plus** 3–3,5 l/ha	Anschliessend 5 mm beregnen. Nicht auf Sand- und Moorböden einsetzen.
Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	**Select** 0,5–1 l/ha + **Zofal R** 1 l/ha	**Select** 0,5–1 l/ha
	Xenturion 1–3 l/ha	**Xenturion** 1–3 l/ha
	Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten. Anwendung bis vor der Blüte oder nach der Ernte.	
Vor der Blüte oder nach der Ernte	**Rapper** 167 g/ha	**Rapper** 167 g/ha
	Max. 1 Behandlung pro Kultur und Jahr.	

Schutz vor Krankheiten

Rote Wurzelfäule und Rhizomfäule	**Alial 80 WG** 5 kg/ha	Im Giess- oder Spritzverfahren über die Pflanzen. Herbst: vorbeugende Behandlung Ende August bis Mitte September (wüchsiges Wetter). Vegetationsbeginn: Einsatz vor Blütebeginn. Max. 4 Behandlungen.	dito
	Max. 3 Behandlungen. **Stamina S** 5 l/ha	Giessbehandlung vor der Blüte oder nach der Ernte.	**Stamina S** 5 l/ha
Echter Mehltau	**Armicarb** 3 kg/ha		Wartefrist: 3 Tage.
	Regelmässige Behandlung im Abstand von 8 Tagen. Für den biologischen Land- und Gartenbau zugelassen.		
	Slick 0,5 l/ha		Wartefrist: 3 Wochen.
	Sufralo 2–4 kg/ha		
Echter Mehltau und Teilwirkung Botrytis	**Vacciplant** 1 l/ha		Wartefrist: 0 Tage.
Echter Mehltau, Blattflecken, gute Teilwirkung Botrytis	Max. 3 Behandlungen. **Amistar** 1 l/ha		Wartefrist: 14 Tage.