# Aprikosen, Pfirsiche und Nektarinen

| Austrieb | Vorblüte | Blüte | Nachblüte | Triebabschluss | Ernte |
|---|---|---|---|---|---|

## Schutz vor Krankheiten

| | | |
|---|---|---|
| Schrotschuss und Kräuselkrankheit (Pfirsich) | **Kocide 2000** 4–6,4 kg/ha oder **Oxykupfer 35** 0,2–0,3 % (3 kg/ha) | Max. 4 kg Kupfer-Metall je Hektar und Jahr. |
| | **Bordeaux S** 8–12 kg/ha (0,5–0,75 %) | |
| | **Cupric Flow** 8–12 l/ha | |
| Echter Mehltau, Schrotschuss und Monilia (Blüten-, Zweigdürre und Fruchtfäule) | Max. 4 Behandlungen pro Jahr. **Slick** 0,32 l/ha + **Captan S WG** 1,6 kg/ha | |
| Echter Mehltau nur in Pfirsich und Nektarinen | **Tofa** 0,15 l/ha | Wartefrist: 21 Tage. |
| Schrotschuss und Monilia | **Amistar** 1,6 l/ha | Bis spätestens Ende Blüte. |
| Schrotschuss | **Captan S WG** 2,4 kg/ha | 2–3 Behandlungen nach der Blüte. |
| Blüten- und Zweigdürre | **Armicarb** 4,8 kg/ha<br>Ein Zusatz von Anti-Mousse reduziert die Schaumbildung. | |
| | Blüte bis 50 % Fruchtgrösse. **Fezan** 0,48 l/ha | Max. 3 Behandlungen/Parzelle und Jahr. |
| Blüten- und Zweigdürre und Monilia | **Avatar** 1 kg/ha | |

Strategie Monilia: 1. Behandlung in aufgehende Blüte, 2. Behandlung in volle bis abgehende Blüte, 3. Behandlung Schorniggelstadium.

## Schutz vor Schädlingen

| | | |
|---|---|---|
| Blattläuse | **Gazelle SG** | **Gazelle SG** 0,015 % (240 g/ha) |
| | **Pirimor** | **Pirimor** 320–640 g/ha |
| Spinnmilben | **Nissostar** 0,32 l/ha Nur eine Behandlung/Jahr. | **Nissostar** 0,32 l/ha Bis Ende Juni. |
| Frostspanner, Gespinnstmotte und Schalenwickler | **Wormox** 0,8–1 kg/ha | **Wormox** 0,8–1 kg/ha |
| Pfirsichwickler Apfelwickler | **ChecMate** Dispenser Arbo CM-XL 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha<br>Montage Mitte April. Anzahl Dispenser ist abhängig von der Anlagegrösse. Kontakt mit Aussendienst.<br>Möglichst geringe Ausgangspopulation (nicht über 1–2 % Befall im Vorjahr). | |
| Apfelwickler und Schalenwickler Verwirrung | **CheckMate** Leaf Multi 2–3 Puffer/ha oder 300–400 Dispenser/ha<br>Montage Mitte April. Anzahl Dispenser ist abhängig von der Anlagegrösse. Kontakt mit Aussendienst.<br>Möglichst geringe Ausgangspopulation (nicht über 1–2 % Befall im Vorjahr). | |
| | 3 Behandlungen mit je 1 l/ha. Geeignet auch gegen Spätbefall.<br>Wirkungsdauer: 12 Tage. Gekühlt lagern bei ca. 5 °C.<br>+ Lufix 2 l/ha (UV-Schutz). | **Carpovirusine Evo2** 1 l/ha |
| Pfirsichwickler, Apfelwickler, Pfirsichmotte | | **Atac** 3,2 kg/ha<br>Max. 2 Behandlungen. Wartefrist: 3 Wochen. |
| Pfirsichwickler in Nektarine und Pfirsich | **Elvis** 0,2 l/ha<br>Wartefrist: 7 Tage. | |

Obstbau