Beeren

Himbeeren, Brombeeren, Johannisbeeren, Cassis

	Austrieb	Triebwachstum	Beginn Blüte	Vollblüte	Ernte	Nach der Ernte

Schutz vor Krankheiten | Himbeeren, Brombeeren

Rutenkrankheiten		**Kocide 2000** 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha)				dito
		oder				
		Cupric Flow 5 l/ha		Max. 4 kg Kupfer-Metall pro Hektar und Jahr. Ribesarten: Wartefrist: 3 Wochen.		**Cupric Flow** 5 l/ha
		Bordeaux S 0,5–1,3 % (5–13 kg/ha)				dito
Rutenkrankheiten / Teilwirkung	Max. 3 Behandlungen.	**Amistar** 1 l/ha				**Amistar** 1 l/ha
Botrytis	Max. 1 Behandlung.		**Frupica SC** 1 l/ha			Wartefrist: 14 Tage.
	Max. 2 Behandlungen. Inkl. Heidelbeeren.		**Avatar** 1 kg/ha			Wartefrist: 14 Tage.
Himbeerrost		**Slick** 0,5 l/ha	Max. 4 Behandlungen.			**Slick** 0,5 l/ha
Falscher Mehltau der Brombeere		**Stamina S** 4 l/ha				
Wurzelsterben der Himbeeren	**Stamina S** 4 l/ha					dito

Schutz vor Krankheiten | Johannisbeeren

Mondscheinigkeit	**Atollan** 0,75–1 kg/ha		Anwendung nur bei Johannisbeeren bis zur Blüte.			
	Avatar 1 kg/ha		Max. 2 Behandlungen.			Wartefrist: 7 Tage.
Mondscheinigkeit und Echter Mehltau		**Amistar** 1 l/ha				**Amistar** 1 l/ha
	Max. 3 Behandlungen.					Wartefrist: 3 Wochen.
Rutenkrankheit und Blattfallkrankheit an Johannisbeeren	**Kocide 2000** 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha)					dito
		oder				
	Cupric Flow 5 l/ha					**Cupric Flow** 5 l/ha
	Max. 4 kg Kupfer-Metall pro Hektar und Jahr. Ribesarten: Wartefrist: 3 Wochen.					
	Bordeaux S 0,25–1,3 % (2,5–7,5 kg/ha)					dito
Echter Mehltau		**Slick** 0,5 l/ha	Max. 4 Behandlungen.			**Slick** 0,5 l/ha
		Armicarb 3–4 kg/ha				Wartefrist: 3 Tage.
	Nur schwarze Johannisbeeren.					