Kohlarten

Blattkohle, Blumenkohl, Kopfkohle, Rosenkohl



Vor der Pflanzung	Nach der Pflanzung	3–6-Blatt	8–10-Blatt	Kopf gebildet	Ernte

Schutz vor Schädlingen

Erdfloh, Eulenraupen, Drehherzgallmücke	Wartefrist: 14 Tage.	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha oder **Deltastar** 0,3 l/ha
Mehlige Kohlblattlaus	Wartefrist: 14 Tage, Rosenkohl: 21 Tage.	**Gazelle SG** 0,25 kg/ha
Weisse Fliegen (Mottenschildläuse)	In Freiland Broccoli, Kopfkohle und Romanesco. Wartefrist: 14 Tage.	**Gazelle SG** 0,325 kg/ha
Blattläuse	Wartefrist: 7 Tage.	**Pirimor** 0,5 kg/ha
Kohlfliege	Angiessen der Jungpflanzen.	**Elvis** 0,2–0,3 %
Erdflöhe, Eulenraupen, Kohldreherherzgallmücken, Weisslinge, Kohlschaben	Wartefrist: 1 Woche.	**Elvis** 0,3–0,4 l/ha
Eulenraupen, Weisslinge, Kohlschaben	Wartefrist: 3 Wochen.	**Atac** 1,5 kg/ha
	Wartefrist: 2 Tage.	**Wormox** 1 kg/ha

Ernährungsoptimierung

Verbesserung der Erntequalität	Erste Behandlung bei Beginn der Kopfbildung (BBCH 41) gefolgt von 4–5 weiteren Behandlungen im Abstand von 10–12 Tagen bis 3 Wochen vor der Ernte.	**Calshine** 2,5 l/ha
Pflanzenaktivator	3 Behandlungen in Mischung mit Fungiziden oder Insektiziden.	**Goëmar Multi** 3 l/ha
	Blattgesundheit.	**Green On Micro** 0,5 kg/ha
Schwefelblattdüngung		**Sulfo S** 4 l/ha
Netzmittel		**Sticker** 0,15 l/ha

Sticker als Mischpartner für alle Fungizid- und Insektizidmassnahmen. Verbessert die Benetzung wegen der Wachsschicht des Kohls und reduziert die Abtrift. Verzögert die Antrocknung und Verdunstung der Spritzbrühe bei heisser Witterung. Sticker als letztes Produkt beigeben.