Kohlarten

Blattkohle, Blumenkohl, Kopfkohle, Rosenkohl

Vor der Pflanzung	Nach der Pflanzung	3–6-Blatt	8–10-Blatt	Kopf gebildet	Ernte

Unkrautregulierung

Vor der Pflanzung	**Sitradol Tec**	4–5 l/ha	Tiefere Dosierung auf leichte und mittelschwere Böden.
Nach der Pflanzung. Einjährige Unkräuter und Gräser	**Devrinol Plus**	3 l/ha	Nach dem Pflanzen spritzen und leicht einregnen.
	oder		
	Devrinol Plus + Cargon S	2 l/ha 0,15–0,25 l/ha	
Ausfallgetreide, Rispengras, Hirsen u. a. Gräser	Anwendung nur in Kopfkohl. Sehr gute Wirkung gegen Rispengrasarten.	**Select** 0,5–1 l/ha **+ Zofal R** 1 l/ha	Wartefrist bei 0,5 l/ha: 4 Wochen; bei 1 l/ha: 8 Wochen.
		Xenturion 1–3 l/ha	

Schutz vor Krankheiten

Kohlschwärze, Alternaria-Kohlschwärze, Echter Mehltau, Falscher Mehltau, Botrytis (Teilwirkung)	Vorbeugend einsetzen, max. 3 Behandlungen. Wartefrist: 14 Tage.	**Amistar** 1 l/ha	
Weisser Rost, Ringflecken, Alternaria-Kohlschwärze	Lagerkohl ab Kopfbildung vorbeugend behandeln. Max. 4 Behandlungen. Wartefrist: 14 Tage.	**Slick** 0,5 l/ha	
Adernschwärze, Echter Mehltau, Phoma, Pseudomonas, Weichfäule	4 Behandlungen. Wartefrist: 3 Wochen.	**Oxycuivre 35** 3 kg/ha	
Echter Mehltau		**Armicarb** 3 kg/ha	Bei Befallsgefahr. Wartefrist: 3 Tage.

Spritzenreinigung nach jedem Herbizideinsatz mit All Clear Extra oder Vapi Clean.