# Weinbau

| | Austrieb | Triebe 5 cm | Vorblüte | Blüte | Nachblüte | Traubenschluss |
|---|---|---|---|---|---|---|

## Schutz vor Krankheiten

| | |
|---|---|
| Falscher Mehltau mit Nebenwirkung gegen Botrytis | **Quadris Max** 0,2 % (1,2–3,2 l/ha) |
| | **Fantic F** 0,2 % (1,6–2,4 kg/ha) |
| | **Amarel-Folpet DF** 0,15 % (1,2–2,4 kg/ha) |
| | Mit guter abstoppender Wirkung. **Eleto** 0,065 % (0,5–1 l/ha) + **Folpet 80 WDG** 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha) |
| | **Stamina S** 0,2 % (1,6–3,2 l/ha) + **Folpet 80 WDG** 0,1 % (0,8–1,6 kg/ha) |
| | **Sporex** 0,016 % (0,25 kg/ha) + **Folpet 80 WDG** 0,125 % (1,6 kg/ha) |
| | **Amarel Kupfer DF** 0,25 % (4 kg/ha) |
| Falscher Mehltau | Stopp-Behandlung, zweimal innert sieben Tagen. **Amarel-Folpet DF** 0,15 % (1,2–2,4 kg/ha) + **Leimay** 0,36 l/ha |

| | |
|---|---|
| Echter Mehltau Kontaktwirkung | **Sufralo** 0,1–0,2 % (1,2–3,2 kg/ha) |
| | Lagen mit starkem Befallsdruck 0,2–0,4 % (3,2–6,4 kg/ha). |
| | **Armicarb** 0,2 % (1,6–3,2 kg/ha) |
| Echter Mehltau Stopp-Behandlung | **Armicarb** 3,2 kg/ha + **Sufralo** 3,2 kg/ha |
| | Nach 7 Tagen wiederholen. |
| Echter Mehltau Tiefenwirkung | Alle Produkte<br>– abwechselnd einsetzen<br>– gut mischbar mit unseren Produkten gegen Falschen Mehltau |
| | **Talendo** 0,025 % (0,2–0,4 l/ha) |
| | **Cyflamid** 0,03 % (0,24–0,48 l/ha) |
| | **Tofa** 0,0095 % (0,076–0,15 l/ha) |
| | **Fezan** 0,025 % (0,25–0,4 l/ha) oder **Slick** 0,0125 % (0,1–0,2 l/ha) |
| Echter Mehltau (Teilwirkung) | **Vacciplant** 0,125 % (0,5–2 l/ha) |
| Falscher Mehltau und Teilwirkung Botrytis | Als Abschlussbehandlung bis Ende August. **Kocide 2000** 0,125–0,2 % oder **Oxykupfer 35** |
| | **Bordeaux S** 0,25 % |
| | **Cupric Flow** 0,25 % |