

# Devrinol® Top

Herbicide de pré- et post-levée dans le colza et le tabac.

## Description du produit en bref

Herbicide de pré et post-levée contre les mauvaises herbes annuelles et les graminées dans le colza et le tabac.

## Matières actives

345 g/l Napropamide (31.5%) 30 g/l Clomazone (2.73%)

## Formulation

Suspension concentrée (SC)

## Trademark

United Phosphorus Ltd, UK

## Numéro d'homologation

W-5916

## Mode d'action

Devrinol Top est composé de deux matières actives complémentaires :

La **Napropamide** qui appartient à la famille chimique des acétamides. Elle est absorbée par les pousses. Elle détruit les adventices au moment de leur germination et limite la formation des racines.

La **Clomazone** appartient à la famille chimique des pyrolidones. La matière active est absorbée principalement par les racines et par les feuilles. Il est très rapidement véhiculé dans toute la plante. Il agit directement sur la photosynthèse en inhibant l'anabolisme des caroténoïdes, entravant ainsi la formation de la chlorophylle.

Devrinol Top possède une longue durée d'efficacité.

## Utilisation Grandes cultures

### Colza

Dosage : 3.0 l/ha en pré-levée des adventices après le semis jusqu'à 10 jours après le semis au plus tard (colza et mauvaises herbes sont au stade cotylédon).

### Tabac

Dosage : 2.5 l/ha au printemps en prélevée avant ou immédiatement après la plantation.

## Spectre d'efficacité

**Bonne efficacité** : mercuriale annuelle, véroniques, fumeterre, radis (ravenelle), tabouret des champs, capselle bourse-à-pasteur, ortie royale, éthuse faux-persil, camomille (matricaire), gaillet-gratteron, séneçon commun, arroche étalée, coquelicot (pavot), morelle noire, géranium terrestre, lamiers, mouron des oiseaux.

## Efficacité satisfaisante par conditions

**favorables** : digitale, ray-grass, pâturin, agrostide jouet-du-vent, vulpin des champs, chénopode blanc (farineuse), repousses de céréales, folle-avoine, moutarde des champs, panic pied-de-coq, pensée des champs, renouée persicaire, galinsoga à petites fleurs, centaurée, myosotis des champs, renouée des oiseaux, renouée-liseron.

**Efficacité insuffisante** : amarante, mauvaises herbes vivaces, chiendent, repousses de céréales, sétaire glauque.

## Restrictions

Préparation de la bouillie : Porter des gants de protection + des lunettes de protection ou une visière. Application de la bouillie : Porter des gants de protection + une tenue de protection + une visière

+ un couvre-chef. Les équipements techniques utilisés lors de l'application (p. ex. cabine de tracteur fermée) peuvent remplacer les équipements personnels de protection s'ils offrent de manière avérée une protection semblable ou supérieure. Ne pas traiter par humidité stagnante, en présence de carence nutritive ainsi que sur les cultures affaiblies. En période de sécheresse, appliquer Devrinol Top dans le colza tôt en post-levée, jusqu'au stade 2 feuilles de la culture. Lors de la préparation de la bouillie de pulvérisation porter des gants de protection, une tenue de protection et des lunettes de protection hermétiques ou une visière.

### Miscibilité

Les mélanges avec d'autres herbicides ne sont normalement pas nécessaires. Par contre, en cas de présence de graminées, il est possible de mélanger Devrinol Top 3 l/ha + Successor 600 1-2 l/ha. Application après semis uniquement.

### Rotation culturale

Après la récolte normale d'une parcelle traitée suivit par un travail du sol, il ne subsiste aucune restriction pour la rotation. Lors d'une interruption prématurée de la culture traitée avec Devrinol Top, il est possible de remettre en place sans labour un colza de printemps, des pommes de terre, des pois, des haricots ou du tabac, après un labour, il est possible de semer du maïs ou un blé de printemps. Si après la récolte du tabac, on effectue un labour, il est alors possible de semer un blé de printemps.

### Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL. PI (PER):

### Conditions climatiques

L'efficacité du produit lors d'une application de post-levée n'est aucunement altérée si des précipitations ont lieu après 2 heures qui succèdent le traitement.

### Important à savoir

Certaines plantes cultivées (p. ex. betteraves, légumineuses, maïs) sont très sensibles au Devrinol Top. Éviter absolument la dérive et les chevauchements sur ces cultures ou sur les parcelles destinées à recevoir ces cultures. Après le travail nettoyer le pulvérisateur et les ustensiles

utilisés avec All Clear(R) Extra selon les indications figurant sur les étiquettes.

### Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

### Restes et emballages vides

Les restes de produits doivent être déposés dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente desdits produits. Les récipients vides doivent être nettoyés soigneusement et déposés dans une décharge.

### Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

### Mention d'avertissement

ATTENTION

### Phrases H

**H317** Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux. **H411** Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### Phrases EUH

**EUH401** Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

### Phrases P

**RRV** Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d'entreposage, sur les routes, les chemins

et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

**P102** À conserver hors de portée des enfants.

**P273** Éviter le rejet dans l'environnement.

**P280** Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.

**P501** Éliminer le contenu/réceptacle en prenant toutes les précautions d'usage.

**SP1** Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.



**GHS09**

#### En cas d'urgence, intoxications

Centre d'information toxicologique à Zurich, Tél. 145 ou 044 251 66 66.

#### Emballage

10 02 76 Emballage simple à 5 l

10 02 76 Carton à 4 x 5 l

#### Contact

Stähler Suisse SA

Henzmannstrasse 17 A

4800 Zofingen

Tél: 062 746 80 00

Fax: 062 746 80 08

info@staehler.ch

<http://www.staehler.ch>



**GHS07**