Fiche technique
26.09.2026

Sulfo S

Soufre élémentaire pour la fertilisation foliaire

Description du produit en bref
Soufre élémentaire liquide pour la fertilisation foliaire en arboriculture, viticulture et grandes cultures.

Matières actives
825 g/l Soufre

Formulation
Suspension concentrée (SC)

Trademark
Stähler Suisse SA

Numéro d'homologation
Mineraldünger / engrais minéral

Mode d'action
Sulfo S est un soufre liquide élémentaire pour la fertilisation foliaire. Sulfo S contient un mouillant-étalant. Les petites particules gazeuses de soufre s'attachent sur les plantes. Sulfo S est ensuite transformé en sulfate qui est prélevé par les plantes. Sulfo S montre une très bonne résistance au lessivage. Sulfo S prévient une carence en soufre et optimise l'utilisation de l'azote. Dans les céréales, Sulfo S peut augmenter la quantité protéique, dans le colza, la teneur en huile et dans les légumes, les teneurs en vitamines. Sulfo S a aussi un effet sur la résistance au gel des cultures.

Utilisation Arboriculture
Fruits à noyaux
3 x 2-3 l/ha pour l'amélioration de la qualité des feuilles et des fruits. Application dès le stade jeunes fruits.

Fruits à pépins
3 x 2-3 l/ha pour l'amélioration de la qualité des feuilles et des fruits. Application dès le stade bouton rouge.

Utilisation Céréales
Blé
2-5 l/ha pour couvrir effectivement les besoins en soufre et optimiser l'utilisation de l'azote.

Pour des résultats optimaux, nous recommandons de répartir l'engrais soufré en un à trois apports, pendant les phases de croissance suivantes : au tallage, au début de la montaison et au stade de la dernière feuille.

Orge
2-5 l/ha pour couvrir effectivement les besoins en soufre et optimiser l'utilisation de l'azote.

Pour des résultats optimaux, nous recommandons de répartir l'engrais soufré en un à trois apports, pendant les phases de croissance suivantes : au tallage, au début de la montaison et au stade de la dernière feuille.

Utilisation Cultures de baies
Baies en général
1-3 x 3 l/ha pour l'amélioration de la qualité des feuilles et des fruits. Application dès le stade bouton.

Utilisation Cultures maraîchères
Cultures maraîchères en général
3-5 l/ha. Favoriser un apport suffisant en soufre, selon la culture, dès qu'une masse foliaire suffisante s'est développée.

Utilisation Grandes cultures

Betteraves à sucre et fourragères
2-3 l/ha pour une alimentation suffisante en soufre. Dès le stade 4-6-feuilles.

Colza
5 l/ha pour une alimentation suffisante en soufre et une sécurisation du rendement. Dès le stade 6-feuilles jusqu'au stade début floraison.

Application optimale en mélange avec le traitment contre le charançon de la tige.

Pommes de terre (plantons et consommation)
3-5 l/ha pour une alimentation suffisante en soufre. 1 à 4 semaines après la levée.

Utilisation Viticulture

Vigne
3 - 6 x 3 l/ha pour l'amélioration de la qualité des feuilles et des fruits dès le stade inflorescences visibles.

Restrictions

Suspension liquide uniquement pour l'apport par pulvérisation. Utiliser uniquement lors de carences. Ne pas dépasser les doses de pulvérisation recommandées, n'utiliser qu'avec de bonnes pratiques professionnelles ! Délai d'attente entre la dernière application et la récolte : 7 jours

Miscibilité

Sulfo S est miscible avec nos herbicides, fongicides, insecticides, biostimulants, engrais foliaires et phytorégulateurs. Nous recommandons de toujours ajouter Sulfo S en premier dans la cuve du pulvérisateur.

Production sous label et PI

Il faut tenir compte des lignes directrices PI (PER) et des indications des productions sous LABEL. Admis en agriculture biologique en Suisse selon la liste des intrants du FiBL.

Conditions climatiques

L'efficacité n'est pas altérée si des précipitations ou une irrigation surviennent au moins 2 heures après le traitement

Important à savoir

Pour assurer un mouillage adéquat, utilisez une quantité d'eau suffisante (300 l/ha au maximum).

Évitez les gouttes! L'application de Sulfo S entraîne un dépôt par pulvérisation. Il convient donc de respecter un intervalle suffisant (au moins 3 semaines) entre la dernière application et la récolte. Sulfo S est un produit très concentré, il convient donc de respecter les points suivants : Remuez continuellement la bouillie, il se dépose rapidement, ne le laissez pas reposer toute la nuit. Utilisez autant que possible le récipient en entier, des particules peuvent se former dans les récipients ouverts. Les produits qui sont stockés sur une longue période doivent être secoués tous les 4 mois.

Indications de risques particuliers et conseils de prudence

Pour une utilisation conforme des produits, seules les indications du mode d'emploi sur/ou joint à l'emballage font foi.

Stockage

Stocker le produit à l'abri du gel, au frais et au sec. Bien refermer les emballages entamés. Tenir hors de portée des enfants. Tenir à l'écart des aliments et des fourrages.

Restes et emballages vides

Ne pas réutiliser les emballages vides et les remettre non nettoyés au service de ramassage des ordures. Déposer les résidus dans une déchetterie communale, un centre collecteur pour déchets spéciaux ou dans les points de vente de ces produits.

Indications pour l'acheteur

Nous garantissons que la composition du produit dans son emballage d'origine fermé, correspond aux indications mentionnées sur les étiquettes. Nous déclinons toute responsabilité pour des conséquences directes ou indirectes liées à un entreposage ou à une application non conforme aux recommandations légales, à une mauvaise qualité d'application ou au non-respect des bonnes pratiques agronomiques. De nombreux facteurs, spécialement les particularités régionales, comme par exemple la structure du sol, les variétés et les conditions climatiques peuvent avoir une incidence négative sur l'efficacité souhaitée du produit, voire même aboutir à des dégâts sur les plantes cultivées traitées. Pour des préjudices de cet ordre, nous déclinons toute responsabilité.

Mention d'avertissement

ATTENTION

Phrases H

H317 Peut provoquer une allergie cutanée. **H319** Provoque une sévère irritation des yeux.

Phrases EUH

EUH401 Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

Phrases P

SP1 Ne pas polluer l'eau avec le produit ou son emballage.
P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
P102 À conserver hors de portée des enfants.
P272 Les vêtements de travail contaminés ne doivent pas sortir du lieu de travail.
P280 Porter des gants de protection/ des vêtements de protection/ un équipement de protection des yeux/ du visage.
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: laver abondamment à l'eau et au savon.
P305+P351+P338 EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
P333+P313 En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
P337+P313 Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
P501 Éliminer le contenu/récipient en prenant toutes précautions d'usage.



GHS07

En cas d'urgence, intoxications

Numéro d'urgence 24h Tox Info Suisse: 145 (depuis l'étranger: +41 44 251 51 51).

Emballage

10 04 59 Emballage simple à 10 l
10 04 59 Carton à 2 x 10 l

Contact

Stähler Suisse SA
Henzmannstrasse 17 A
4800 Zofingen
Tél: 062 746 80 00
info@staehler.ch
http://www.staehler.ch