Colza en automne

	Semis	Postsemis	Levée	2 feuilles	4 feuilles	6 feuilles	8 feuilles

Désherbage

Application en présemis direct, mulch et traitement par bandes fraisées	**Roundup PowerMax** 1,5–7,5 l/ha	Application lors d'un semis sans labour avant le travail du sol ou le semis. Pour les CSP, max. 3,1 l/ha.
En prélevée	**Colzaphen** 3 l/ha	Traiter jusqu'à 5 jours après le semis.
En prélevée ou tôt en postlevée	**Devrinol Top** 3 l/ha	Le numéro 1 dans le désherbage **Jusqu'à 10 jours après le semis.**
Lors d'une forte pression de mauvaises herbes	**Devrinol Top** 3 l/ha **+ Successor 600** 1–2 l/ha	
Fertilisation soufrée	**Sulfo S** ou **Prosulf** 5 l/ha (répulsif contre les altises)	
Activateur de plante et du sol	**Triagol** 2,5 l/ha	
	Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments les plus importants. Idéal pour la combinaison avec le désherbage. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.	
Traitement de correction Repousses de céréales et mauvaises herbes levées	Miscible avec nos fongicides ou nos insecticides.	**Select** 0,5 l/ha **+ Xenturion** 0,5–1 l/ha
	Au début de l'hiver. Particulièrement contre le vulpin des champs. Un sol frais favorise la durée de l'efficacité. Pour une application après le 15 novembre, demander une autorisation.	**Nizo S** 1,8 l/ha

Ravageurs

Limaces	**Métarex INOV** 5 kg/ha ou **Ironmax Pro** 7 kg/ha	Selon la météo et la population de limaces, répéter plusieurs fois l'application.
Altise, tenthrède de la rave	1er contrôle au stade cotylédons. 2e contrôle/traitement fin octobre avant la ponte.	**TAK 50 EG** 0,15 kg/ha ou **Deltastar** 0,3 l/ha

Maladies

Phoma (nécrose du collet du colza)	Application fin septembre/début octobre sur un colza en pleine croissance. L'application a un effet de raccourcissement et améliore la résistance en hiver. Miscible avec 0,5 l/ha de Select et TAK 50 EG, 0,15–0,2 kg/ha.	**Fezan** 1 l/ha
Raccourcisseur		**Medax** 0,5–1 l/ha

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.

Remarques générales | Possibilité de remplacement de la culture de colza au printemps.

- **Sans labour:** Devrinol Top, Colzaphen — Pommes de terre, colza de printemps, haricots, soja, tournesol, choux et tabac
- **En plus après labour:** Devrinol Top, Colzaphen — Maïs, féverole, pois, blé de printemps
- **Nizo S:** aucune variété de céréales

Colza au printemps

Formation de rosettes	Croissance	Boutons floraux	Début floraison	Pleine floraison

Désherbage

Graminées levées à la reprise de la végétation	**Select** 0,5 l/ha + **Xenturion** 1 l/ha	Miscible avec nos insecticides contre le charançon de la tige.
Chardons	**Rapper** 167 g/ha	

Ravageurs

Charançons de la tige	**Deltastar** 0,4 l/ha	Application précoce, avant la ponte. Touche également les premières méligèthes.	
Méligèthes avant floraison	1er traitement	**Gazelle SG** 150 g/ha + **Sticker** 0,15 l/ha	Pas de restriction de distance aux eaux de surface. Longue durée d'efficacité, protège les ramifications.
	Traitement de suite	**Gazelle 120 FL** 0,25 l/ha + **Sticker** 0,15 l/ha	
		Elvis 0,2 l/ha + **Sticker** 0,15 l/ha	
Variante BIO		**Surround** 20–25 kg/ha + **Lufix** 2 l/ha	
	Efficacité partielle. Le kaolin a un effet répulsif. Répéter évt. l'application après des précipitations (lessivage). Autorisé en Extenso et culture biologique.		

Maladies

Phoma	**Medax** 0,5–1 l/ha	
	Fezan 1,5 l/ha	Miscible avec le traitement contre les charançons de la tige.
Sclérotiniose	Application début floraison. Miscible avec Goëmar Multi. Améliore la résistance.	**Escape** 0,7 l/ha ou **Fezan** 1,5 l/ha

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur et carence en bore	**Goëmar Multi** 3 l/ha Favorise la croissance des siliques et la formation des grains. En mélange avec nos insecticides et nos fongicides.
Carence en manganèse	**Green On Micro** 0,5 kg/ha
Fertilisation soufrée	**Sulfo S** ou **Prosulf** 3–5 l/ha
Engrais foliaire	**Triagol** 2,5 l/ha ou **Engrais liquide S** 5–10 l/ha
Au début de la floraison	**Vitaly** 2 l/ha