Colza au printemps

Formation de rosettes	Croissance	Boutons floraux	Début floraison	Pleine floraison

Désherbage

Graminées levées à la reprise de la végétation	**Select** 0,5 l/ha + **Xenturion** 1 l/ha	Miscible avec nos insecticides contre le charançon de la tige.
Chardons	**Rapper** 167 g/ha	

Ravageurs

Charançons de la tige	**Deltastar** 0,4 l/ha	Application précoce, avant la ponte. Touche également les premières méligèthes.	
Méligèthes avant floraison	1er traitement	**Gazelle SG** 150 g/ha + **Sticker** 0,15 l/ha	Pas de restriction de distance aux eaux de surface. Longue durée d'efficacité, protège les ramifications.
	Traitement de suite	**Gazelle 120 FL** 0,25 l/ha + **Sticker** 0,15 l/ha	
		Elvis 0,2 l/ha + **Sticker** 0,15 l/ha	
Variante BIO		**Surround** 20–25 kg/ha + **Lufix** 2 l/ha	
	Efficacité partielle. Le kaolin a un effet répulsif. Répéter évt. l'application après des précipitations (lessivage). Autorisé en Extenso et culture biologique.		

Maladies

Phoma	**Medax** 0,5–1 l/ha	
	Fezan 1,5 l/ha	Miscible avec le traitement contre les charançons de la tige.
Sclérotiniose	Application début floraison. Miscible avec Goëmar Multi. Améliore la résistance.	**Escape** 0,7 l/ha ou **Fezan** 1,5 l/ha

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur et carence en bore	**Goëmar Multi** 3 l/ha Favorise la croissance des siliques et la formation des grains. En mélange avec nos insecticides et nos fongicides.
Carence en manganèse	**Green On Micro** 0,5 kg/ha
Fertilisation soufrée	**Sulfo S** ou **Prosulf** 3–5 l/ha
Engrais foliaire	**Triagol** 2,5 l/ha ou **Engrais liquide S** 5–10 l/ha
Au début de la floraison	**Vitaly** 2 l/ha