Pommes de terre

Fermeture de la ligne | Fermeture entre les lignes | Floraison | Lignification de la tige | Maturité

Application standard contre le mildiou de la pomme de terre

La phase de croissance adaptée	**Amistar** 0,75 l/ha + **Sporex** 0,25 kg/ha — Max. 3 applications.
	Eleto 1 l/ha + **Leimay** 0,5 l/ha + **Slick** 0,5 l/ha — Max. 3 applications.
	Nospor Combi 0,6 l/ha
	Eleto 1 l/ha

Fongicides de contact

	Leimay 0,5 l/ha
	Zignal 0,4 l/ha
	Bordeaux S 6–8 kg/ha ou **Kocide 2000** 3 kg/ha Max. 4 kg de cuivre métal par ha et année.

Partenaire de mélange lors d'une forte pression d'alternariose

Alternaria	**Amistar** 0,75 l/ha Préventif, appliquer tôt. Miscible avec nos produits contre le mildiou.
	Slick 0,5 l/ha

Action stoppante lors d'une forte pression de mildiou

Lors d'attaque de mildiou, répéter les applications tous les 3–5 jours. Zignal et Leimay sont des partenaires de mélange appropriés lors d'une forte pression de mildiou grâce à leur action anti-sporulante.	**Leimay** 0,5 l/ha + **Nospor Combi** 0,6 l/ha
	Après 3 à 5 jours **Zignal** 0,4 l/ha (ou Leimay 0,5 l/ha) + **Eleto** 1 l/ha

Protection contre les UV et les rayonnements

Protection contre le soleil à appliquer avant de grosses chaleurs ou périodes de sécheresses	**Lufix** 2 l/ha
	Surround 6–12 kg/ha + **Lufix** 2 l/ha Miscible avec Zignal et Leimay.

Remarques importantes

- Adapter les intervalles fongicides aux nouvelles pousses et à la pluviométrie.
- Ajouter 2 × 2,5 l/ha de Calshine pendant la phase de croissance pour un apport de Ca. Inhibe les fissures de croissance.
- Anti-Mousse S pour réduire la formation de mousse.