Pommes de terre

	Plantation	Fermeture de la ligne	Fermeture entre les lignes	Floraison	Lignification de la tige	Maturité

Ravageurs

Limaces	**Métarex INOV** 5 kg/ha ou **Ironmax Pro** 7 kg/ha Pour protéger les tubercules des morsures. Répéter les applications plusieurs fois en fonction des conditions météo du début juin jusqu'au défanage.	
Contre les stades précoces des larves de doryphores.	**Sicid Neem** 1,5 l/ha	
Doryphores	**Elvis** 0,05 l/ha + **Sticker** 0,15 l/ha	
	Agit sur tous les stades contre le doryphore. **Gazelle SG** 100 g/ha	En PER avec autorisation spéciale.
Pucerons	Efficacité systémique pendant 2 semaines. **Gazelle SG** 200 g/ha	En PER avec autorisation spéciale.

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur	**Radi S** 3 l/ha	A la plantation: Stimule le développement des racines ainsi que l'absorption active des éléments nutritifs. Il en résulte des calibres plus homogènes des tubercules. Idéalement en combinaison avec tous les produits de traitement des semences ou lors de la première application fongicide.
Carence en manganèse	**Green On Micro** 0,5 kg/ha	
Activateur de plante et du sol	**Triagol** 2,5 l/ha ou **Vitaly** 2 l/ha Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments les plus importants. Idéal en mélange au printemps avec d'autres mesures phytosanitaires. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.	
	Goëmar Start 3 × 2 l/ha	Appliquer en mélange avec les premiers traitements fongicides. Pour une meilleure croissance des tubercules et une absorption optimale des éléments minéraux. Utiliser Goëmar Opti en terre noire.
Contre l'éclatement	**Calshine** 2 × 2,5 l/ha	Pour une nutrition suffisante en calcium. Limite l'éclatement.
Contre la germination des pommes de terre et leurs repousses	**Germstop** 5 kg/ha	

Défanage

Semenceaux (plants)	Résultat optimal avec un broyage antérieur des fanes. Miscible avec 0,4 l/ha de Zignal. A souligner: Beaucoup de lumière et max. 300 l/ha d'eau.	**Siplant** 18 l/ha + **Mizuki** 1 l/ha Répéter après 5 jours.
Pommes de terre de consommation et industrielles	**Remarques importantes:** Une grande quantité de lumière et de chaleur accélère l'effet. Traiter le matin sur feuilles sèches. Pulvérisation en fines gouttelettes / buses à jet plat. Volume de bouillie: max. 300 l/ha d'eau. **Siplant autorisé dans les pommes de terre IP-Suisse.**	**Siplant** 18 l/ha + **Mizuki** 1 l/ha ou **Mizuki** 1–2 l/ha ou **Siplant** 18 l/ha

Remarques importantes

- Adapter les intervalles fongicides aux nouvelles pousses et à la pluviométrie.
- Ajouter 2 × 2,5 l/ha de Calshine pendant la phase de croissance pour un apport de Ca. Inhibe les fissures de croissance.
- Ajouter 0,5 l/ha de Sticker à nos fongicides pour favoriser l'adhérence de la bouillie et réduire la dérive.
- Anti-Mousse S pour réduire la formation de mousse.