Oignons

Semis	Fouet	1 feuille	4 feuilles	6 feuilles	8–10 feuilles	Formation du bulbe	Maturité	Récolte

Désherbage

Avant semis	**Roundup PowerMax** 4 l/ha	Application 1 jour avant le semis des oignons, contre les mauvaises herbes à problèmes. Miscible avec l'améliorateur du sol Triagol 2,5 l/ha. Meilleure aération et structure du sol.
Prélevée	**Sitradol Tec** 1,5–2,5 l/ha	Sitradol Tec en postlevée, miscible avec Bandur 0,3–0,5 l/ha. Sur sol léger, max. 1 l/ha de Sitradol Tec.
	Natrel 16 l/ha	Pour brûler les mauvaises herbes avant la levée des cultures.
Postlevée précoce	**Natrel** 8–10 l/ha	
Postlevée	**Golaprex Basic** 3 l/ha	Au premier stade (1–3 feuilles) des mauvaises herbes.
À partir de la 2e feuille	**Rapper** 83 g/ha	Délai d'attente: 6 semaines.
	Starane Max 0,12–0,18 l/ha	Délai d'attente: 90 jours.
	Adapter le dosage à la taille des oignons. Au stade 2–3 feuilles 0,12 l/ha + 0,2 l/ha de Bandur. A partir du stade 4 feuilles, 0,18 l/ha + 0,3 l/ha de Bandur.	
Pâturins, millets et autres	Très bonne efficacité contre les pâturins. **Select** 0,5–1 l/ha **+ Zofal R** 1 l/ha	
	Xenturion 1–3 l/ha	

Maladies

Pourriture blanche des allium, botrytis des feuilles	**Avatar** 1 kg/ha	Délai d'attente: 14 jours.
	Pourriture blanche des alliums: semis d'automne traiter au printemps. Oignons d'été au stade 2 feuilles. Répéter l'application après 3 semaines. Botrytis: au début d'une attaque.	
Mildiou et stimulant	**Amistar** 1 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
	Application préventive au début de la saison, max. 3 applications/an. Action stimulante de la plante.	
Cladosporiose, taches pourpres	Max. 4 applications/année. **Slick** 0,5 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Botrytis des feuilles, pourriture de l'oignon	Une application début juillet. Changer de produit pour d'autres applications. **Frupica SC** 1 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Mildiou	**Fandango** 1,25 l/ha	
	A appliquer pendant la période de croissance principale. Ne pas mélanger avec des produits avec formulation EC. Max. 3 applications/année.	Délai d'attente: 21 jours.

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.

Remarques importantes

- **Action stoppante contre le mildiou dès qu'il y a risque de contamination:**
  Fandango 1,25 l/ha + Zignal 0,4 l/ha. Répéter après 3 jours!

Oignons

Semis	Fouet	1 feuille	4 feuilles	6 feuilles	8–10 feuilles	Formation du bulbe	Maturité	Récolte

Maladies (suite)

Taches pourpres, mildiou de l'oignon, rouilles des Alliums, cladosporiose des oignons. Effet partiel sur le botrytis.		**Zignal** 0,5 l/ha	Délai d'attente: 7 jours.
	Dès qu'il y a risque de contamination, pour renforcer l'efficacité des produits systémiques partiels. Fongicide de contact avec bonne résistance au lessivage. Efficacité partielle contre le botrytis.		

Ravageurs

Puceron du feuillage, thrips, mouche mineuse	Appliquer en début de saison lors de températures fraîches.	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha	Délai d'attente: 21 jours.
		Deltastar 0,3 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Thrips	Grâce à son action systémique, idéal pendant la période de croissance.	**Gazelle SG** 0,5 kg/ha	Délai d'attente: 7 jours.
		Elvis 0,4 l/ha	Délai d'attente: 7 jours.

Régulateur de croissance

Inhibiteur de la germination	Inhibe la germination des oignons traités lors du stockage. Application avec 500 l d'eau/ha dès le stade début tombaison, 10–30 % des tiges pliées.	**Germstop** 3,75–4 kg/ha	Délai d'attente: 14 jours.

Pour une nutrition optimale

Activateur de la plante et du sol		**Triagol** 2,5 l/ha	
	Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments. Idéal en mélange avec nos fongicides et insecticides. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.		
	En mélange avec les premières applications de fongicides. Accélère la formation régulière du bulbe.	**Goëmar Start** 2 l/ha	
	Santé du feuillage.	**Green On Micro** 0,5 kg/ha	
		Goëmar Opti 2,5 l/ha	Alimentation en manganèse
Adjuvant		**Sticker** 0,15 l/ha	
	En mélange avec tous les fongicides et insecticides. Pour une meilleure répartition de la bouillie, ajouter Sticker. Il augmente l'effet adhésif de l'application sur la surface de la feuille. Lors de températures élevées, Sticker empêche un dessèchement trop rapide et l'évaporation de la bouillie. Ajouter Sticker en dernier.		
Alimentation en soufre, répulsif thrips, feuilles		**Sulfo S** 3–5 l/ha	