



Oignons

Semis	Fouet	1 feuille	4 feuilles	6 feuilles	8–10 feuilles	Formation du bulbe	Maturité	Récolte
-------	-------	-----------	------------	------------	---------------	--------------------	----------	---------

Maladies (suite)

Taches pourpres, mildiou de l'oignon, rouilles des Alliums, cladosporiose des oignons. Effet partiel sur le botrytis.		Zignal 0,5 l/ha	Délai d'attente: 7 jours.
	Dès qu'il y a risque de contamination, pour renforcer l'efficacité des produits systémiques partiels. Fongicide de contact avec bonne résistance au lessivage. Efficacité partielle contre le botrytis.		

Ravageurs

Puceron du feuillage, thrips, mouche mineuse	Appliquer en début de saison lors de températures fraîches.	TAK 50 EG 0,2 kg/ha	Délai d'attente: 21 jours.
		Deltastar 0,3 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Thrips	Grâce à son action systémique, idéal pendant la période de croissance.	Gazelle SG 0,5 kg/ha	Délai d'attente: 7 jours.
		Elvis 0,4 l/ha	Délai d'attente: 7 jours.

Régulateur de croissance

Inhibiteur de la germination	Inhibe la germination des oignons traités lors du stockage. Application avec 500 l d'eau/ha dès le stade début tombaison, 10–30 % des tiges pliées.	Germstop 3,75–4 kg/ha	Délai d'attente: 14 jours.
------------------------------	---	------------------------------	----------------------------

Pour une nutrition optimale

Activateur de la plante et du sol	Triagol 2,5 l/ha		
	Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments. Idéal en mélange avec nos fongicides et insecticides. Ajouter le produit en dernier dans le réservoir.		
	En mélange avec les premières applications de fongicides. Accélère la formation régulière du bulbe.	Goëmar Start 2 l/ha	
Santé du feuillage.	Green On Micro 0,5 kg/ha		
	Goëmar Opti 2,5 l/ha		Alimentation en manganèse
Adjuvant	Sticker 0,15 l/ha		
En mélange avec tous les fongicides et insecticides. Pour une meilleure répartition de la bouillie, ajouter Sticker. Il augmente l'effet adhésif de l'application sur la surface de la feuille. Lors de températures élevées, Sticker empêche un dessèchement trop rapide et l'évaporation de la bouillie. Ajouter Sticker en dernier.			
Alimentation en soufre, répulsif thrips, feuilles	Sulfo S 3–5 l/ha		