Pommiers

Débourrement | Préfloraison | Floraison | Postfloraison | Eté | Récolte

Maladies

Tavelure	**Matière active de contact, effet uniquement préventif** **Kocide 2000** 2–4 kg/ha ou **Oxycuivre 35** 2 kg/ha — Max. 4 kg de cuivre métal par hectare et année. En PER: max. 1,5 kg de cuivre métal par hectare et année. **Kocide 2000** 1–2 kg/ha ou **Oxycuivre 35** 1–2 kg/ha
	Bordeaux S 2–8 kg/ha — Débourrement: 4–8 kg/ha; préfloraison 2–4 kg/ha
	Cupric Flow 4–8 l/ha — Débourrement: 4–8 l/ha; préfloraison 2–4 l/ha
	Venturex 1,2 l/ha
	Atollan 0,8 kg/ha — Tous les 6–8 jours. Jusqu'à fin juin. Applications après la floraison. Max. 4,85 kg/ha d'Atollan par parcelle et année.
	Max. 10 × / année. **Captan S WG** 2,4 kg/ha — Délai d'attente 3 semaines. **Folpet 80 WDG** 2,5 kg/ha — Délai d'attente 3 semaines. **Stamina S** 3,2 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha — ou Captan S WG 1,6 kg/ha ou Folpet 80 WDG 1,4 kg/ha 1–2 applications avant la floraison, 2–4 applications après la floraison. Max. 6 applications/année. Stamina S (en application seule) 2 l/ha. Délai d'attente 2 semaines.
Tavelure, pourriture de l'œil	Max. 3 applications par année. **Tofa** 0,21 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha — ou Captan S WG 1,6 kg/ha Délai d'attente: 5 semaines.
	Action stoppante **Frupica SC** 0,32 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha ou Captan S WG 1,6 kg/ha 2–3 jours action stoppante après une infection. Max. 3 applications/année.
Tavelure, oïdium	**Action stoppante** 3–4 jours après infection. Max. 4 applications/année. **Slick** 0,24 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha ou **Captan S WG** 1,6 kg/ha — Atollan jusqu'à fin juin, Slick jusqu'à fin juillet.

En mélange

	Parallèlement à la lutte contre la tavelure
Oïdium	**Cyflamid** 0,5 l/ha ou **Tofa** 0,21 l/ha Efficacité renforcée grâce à sa phase gazeuse. Max. 2 applications/année. Délai d'attente 3 semaines.
Oïdium Effet partiel contre la tavelure	**Soufralo** 2 kg/ha — **Soufralo** 8–12 kg/ha — **Soufralo** 4,8–8 kg/ha

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).

Pommiers

Débourrement | Préfloraison | Floraison | Postfloraison | Eté | Récolte

Traitements spéciaux

Feu bactérien	**Vacciplant** 0,75 l/ha — Effet partiel. Appliquer à chaque traitement dès le stade boutons verts jusqu'à fin floraison.
	Contre les infections secondaires (effet partiel). 1re application au stade des pousses de 3–5 cm. 2e application 3–5 semaines plus tard. **Regalis Plus** 2,5 kg/ha/année Lors d'application unique max. 2,5 kg/ha entre le début floraison et fin floraison, max. 1,5 kg/ha entre la postfloraison et jusqu'à ce que le calibre du fruit atteint 50 %.
Régulateur de croissance	**Regalis Plus** 2,5 kg/ha/année Applications fractionnées possibles. Max. 2,5 kg/ha/parcelle/année. Selon la dureté et le pH de l'eau, toujours en mélange avec X-Change 0,1–0,2 %.
Pourriture de l'œil, moniliose, tavelure	Max. 3 applications/année. **Frupica SC** 0,48 l/ha **+ Atollan** 0,48 kg/ha ou **Captan S WG** 1,6 kg/ha
Efficacité partielle Tavelure et oïdium	**Armicarb** 0,2–0,3 % (3–4,8 kg/ha) **+ Soufralo** 0,2 % (3,2 kg/ha) Efficacité partielle contre la tavelure et la maladie de la suie. En cas de températures élevées, seulement 3 kg/ha d'Armicarb. Délai d'attente: 8 jours.
Maladies de conservation	Préventivement tous les 10–14 jours. **Captan S WG** 2,4 kg/ha Délai d'attente 3 semaines. **Folpet 80 WDG** 2 kg/ha Délai d'attente 3 semaines.
Oïdium, tavelure et lenticelles rouges de la pomme	Effet partiel. **Vacciplant** 1 l/ha Délai d'attente 3 jours.

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha). Concept de volume d'arbres sur le site www.staehler.ch.