Pommiers/Poiriers

	Débourrement	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Eté	Récolte

Divers

Adjuvant pour fongicides et insecticides	**Sticker** 0,1 %	Améliore l'adhérence de la bouillie.
	Efical 2,5 kg/ha	
Taches amères, améliore la qualité	Selon les variétés et la charge, 2–6 applications à intervalles de 14 jours.	**Calshine** 2,4 l/ha Ne pas ajouter de mouillant.
Nutrition, physio-activateur	Filtrat d'algue avec bore, Mg, Mn, SO_3.	**Goëmar Start** 3 × 2 l/ha 1 × au stade bouton, 1 × pleine floraison, 1 × fin floraison.
	Filtrat d'algue avec bore.	**Goëmar Multi** 3 × 2 l/ha 1 × au stade bouton, 1 × pleine floraison, 1 × fin floraison.
	Filtrat d'algue avec manganèse, zinc et soufre.	Après la récolte: 2–3 applications. **Goëmar Opti** 3 × 2 l/ha
Fumure foliaire	**Engrais liquide S** 6 l/ha	1 × préfloraison, 1 × floraison, 1 × post-floraison.
Chlorose ferrique	**Ferro-Vit 7** 1,5–2 l/ha	
Améliorateur de la qualité de l'eau et de la valeur pH	**X-Change** 0,15–0,2 l / 100 l bouillie	
Protection contre les UV	**Lufix** 2 l/ha	
Engrais foliaire à base de soufre	**Prosulf** 3–5 l/ha	
Anti-mousse	**Anti-Mousse S** 10–45 ml / 200 l d'eau	
Nettoyant biologique	**Vapi Clean** 0,5 l/100 l d'eau	

Pour une nutrition optimale

Régulateur de croissance	**Novagib**	0,5–0,6 l/ha Pommes: Régulateur de croissance pour réduire la rugosité des pommes. Poires: Pour augmenter la nouaison. **Veuillez respecter le mode d'emploi.**
	Dartilon 0,3 l/ha	Au stade début floraison (BBCH 59), jusqu'à fin floraison (BBCH 67) ou 14 jours après la fin floraison. Consulter le mode d'emploi.
Eclaircissage (pommes)	**Armicarb** 10–20 kg/ha **Dirigeol-N** 120–320 g/ha	Elstar, Gala 2 × 10–15 kg/ha. Golden,Maigold 2 ×15 kg/ha. Ne pas traiter les variétés Otava, Topaz.
Contre la chute prématurée des fruits	Sur les variétés sensibles, 5 semaines, 3 semaines et 10 jours avant la récolte. Délai d'attente 10 jours. Ne pas traiter les variétés Gala et Braeburn!	**Dirigeol-N** 80–160 g/ha
Prévention contre les dégâts dus au gel	**Naturamin WSP** 3 × 1 kg/ha	

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).

Pommiers/Poiriers

	Débourrement	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Eté	Récolte

Désherbage

Herbicide racinaire	**Nizo S**	2,5–4 l/ha (dicotylédones et graminées) 5–6,25 l/ha (chiendent)		Application en hiver pendant le repos de la végétation. Meilleure efficacité durable sur sol frais (non autorisé en PER).		
Traitement de surface de la bande des arbres	Valable pour tous les produits!	**Exelor** 2,5 l/ha		**Exelor** 2,5 l/ha	Contre l'épilobe, trèfle blanc, renoncule, lierre terrestre, etc. Dès la 1re année de plantation (max. 20 °C).	
Graminées levées		**Select** 0,5–1 l/ha **Xenturion** 1–3 l/ha		**Select** 0,5–1 l/ha **Xenturion** 1–3 l/ha		
Mauvaises herbes annuelles et vivaces	Sur les mauvaises herbes levées jusqu'à fin juin, dès la 2e année de plantation.	idem		**Roundup PowerMax** 1,5–7,5 l/ha		
Mauvaises herbes annuelles et graminées		**Roundup PowerMax** 1,5–2,25 l/ha		**Natrel** 16 l/ha Natrel: Bonne efficacité sur les jeunes graminées, idéal comme application de suite après Roundup PowerMax.		
Rejets		**Mizuki** 0,5 %		**Mizuki** 0,5 % A partir de la 3e année de plantation, max. 2 applications par parcelle/année.		
Rumex				**Trifulox** 3–4 l/ha		
Physio-activateur	**Radi S** 3 × 3,5 l/ha					**Radi S** 3 × 3,5 l/ha
	Favorise l'activité racinaire et la formation de racines fines, augmente ainsi l'absorption des nutriments et accélère le transport des hormones de croissance dans les plantes.					
Activateur de plante et du sol	**Triagol** 2,5 l/ha					
	Stimule les plantes par les feuilles et le sol. Augmente la disponibilité et l'assimilation des oligo-éléments et des principaux nutriments. Idéal en mélange avec nos herbicides et fongicides. Ajouter le produit en dernier dans la cuve.					
Améliore la nouaison et prévient les dégâts dus au gel	**Naturamin WSP** 3 × 1 kg/ha					

Nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.