Pommiers

Débourrement | Préfloraison | Floraison | Postfloraison | Eté | Récolte

Ravageurs

Cochenille diaspine, cheimatobie, ériophyide gallicole, cochenille lécanine, acarien rouge	**Zofal D** 56 l/ha Stade B–C. ou Zofal R 2 % 30–40 l/ha.	A partir de 10 °C, ne pas appliquer en cas de danger de gel. Miscible avec Oxycuivre et Kocide 2000. Dosage avec le Gun 2,5–3,5 l/100 l d'eau (2,5–3,5 %). Ne pas mélanger avec Atollan.
Acarien rouge	**Zofal D** 32 l/ha Stade D.	
	Zofal D 16 l/ha Stade E.	
Anthonome du pommier	**Gazelle SG** 0,32 kg/ha Stade B–C. Gazelle SG: max. 2 applications/culture/année. **Elvis** 0,32 l/ha	
Puceron du feuillage	**Gazelle SG** 240 g/ha **Gazelle SG** 240 g/ha 160 g/ha Dosage: avant et après la floraison 240 g/ha. A partir de juillet 160 g/ha. Max. 1 application/année sur les mêmes espèces de pucerons, max. 2 applications/culture/année.	
Puceron du feuillage, effet partiel sur la cochenille virgule	PER: 1 application par parcelle et année. Pour augmenter l'efficacité, ajouter 0,15 l/ha de Sticker.	**Pirimor** 640 g/ha 320 g/ha
Stratégie contre le pouceron lauigère soutenue par l'homéopathie	3 applications à intervalles de 3 jours. Ensuite, traitement de suivi avec Pirimor.	**Vitex Blutlaus** 1 l/ha + **Vitex Plus** 1 l/ha **Pirimor** 640 g/ha
Cheimatobie, noctuelle	**Atac** 0,2 % (3,2 kg/ha) ou Elvis 0,32 l/ha	
Cheimatobies, hyponomeutes et tordeuse de la pelure	**Wormox** 0,8–1 kg/ha **Wormox** 0,8–1 kg/ha	
Carpocapse, tordeuse de la pelure et petite tordeuse des fruits	**Atac** 3,2 kg/ha **Atac** 3,2 kg/ha **Atac** 3,2 kg/ha Seulement dans les cultures fruitières. Délai d'attente: 3 semaines. Max. 2 applications. **Elvis** 0,32 l/ha **Elvis** 0,32 l/ha **Elvis** 0,32 l/ha	
Punaises des fruits	**Elvis** 0,32 l/ha **Elvis** 0,32 l/ha	

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).

Pommiers

	Débourrement	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Eté	Récolte

Ravageurs

Acariens rouge et jaune			**Nissostar** 0,32 l/ha Œufs d'hiver avant la floraison, œufs d'été env. 14 jours après la floraison, au plus tard jusqu'au 30 juin. Max. 1 × /année.			
			Contre les stades mobiles. Traiter immédiatement ou 3 semaines après la floraison. Pour une bonne mouillabilité, ajouter 0,15 l/ha de Sticker.	**Kanemite** 1,8 l/ha		
Eriophyide libre (effet partiel)	12 kg/ha **Soufralo** 8 kg/ha PER: 4–5 applications/année avec 4–5 kg/ha.			**Soufralo** 4,8–8 kg/ha		
Puceron du feuillage et acariens		**Oleate 20** 10–15 l/ha		**Oleate 20** 10–15 l/ha Délai d'attente: 3 semaines.		
Puceron cendré du pommier (pomme)		**Sicid Neem** 1,5 l/ha		**Sicid Neem** 1,5 l/ha	Jusqu'à fin mai.	
Hoplocampe des pommes	Postfloral. Gazelle SG: max. 2 applications/culture/année.			**Gazelle SG** 240 g/ha		
Confusion sexuelle contre le carpocapse			**CheckMate** Dispenser Arbo CM-XL 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha Mise en place fin mars. Le nombre de dispensers ou de puffers est calculé en fonction de la surface du verger. En cas de doute, prendre contact avec notre service externe. Condition: attaque faible lors de l'année précédente (pas plus de 1–2 %). **CheckMate** Puffer Arbo CM 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha			
Confusion sexuelle contre le carpocapse et la tordeuse de la pelure			**CheckMate** Leaf Multi 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha			
Carpocapse des pommes, Tordeuse orientale du pêcher			Au moins 3 applications de 1 l/ha chacune. Idéal lors d'attaque tardive. Durée d'efficacité 12 jours. A conserver au frais à env. 5 °C. + Lufix 2 l/ha (protection contre les UV).	**Carpovirusine Evo2** 1 l/ha Délai d'attente seulement 1 semaine.		
Soutien de la croissance et de la santé du feuillage			**Vitex Plus** 1 l/ha + **Vitex Verde** 1 l/ha			

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).