Poiriers

Débourrement | Préfloraison | Floraison | Postfloraison | Eté | Récolte

Maladies

Tavelure

Matière active de contact, effet préventif

Kocide 2000 2–4 kg/ha ou **Oxycuivre 35** 2 kg/ha
Max. 4 kg de cuivre métal par hectare et année.
PER: max. 1,5 kg de cuivre métal par hectare et année.

Kocide 2000 1–2 kg/ha ou **Oxycuivre 35** 1–2 kg/ha

Bordeaux S 2–8 kg/ha — Débourrement: 4–8 kg/ha; préfloraison: 2–4 kg/ha.

Cupric Flow 2–8 l/ha — Débourrement: 4–8 l/ha; préfloraison: 2–4 l/ha.

Venturex 1,2 l/ha

Atollan 0,8 kg/ha — Tous les 6–8 jours. Jusqu'à fin juin.
Applications postfloraison: max. 4,85 kg/ha d'Atollan par parcelle et année.

Max. 10 × / année. **Captan S WG** 2,4 kg/ha
Délai d'attente 3 semaines.

Max. 6 applications/année. **Stamina S** 3,2 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha ou Captan S WG 1,6 kg/ha
1–2 applications préfloraison, 2–4 applications postfloraison.

Action stoppante
Frupica SC 0,32 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha ou Captan S WG 1,6 kg/ha
Max. 3 applications/année. 2–3 jours action stoppante après une infection, préventivement 6–8 jours.

Tavelure et oïdium

Tofa 0,21 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha ou Captan S WG 1,6 kg/ha

Tavelure, oïdium

Action stoppante
Max. 4 applications/année.
Slick 0,24 l/ha + **Atollan** 0,48 kg/ha ou **Captan S WG** 1,6 kg/ha — Atollan jusqu'à fin juin, Slick jusqu'à fin juillet.
2–3 jours action stoppante après une infection.

En mélange

Parallèlement à la lutte contre la tavelure

Oïdium

Max. 2 applications/année. **Cyflamid** 0,5 l/ha ou **Tofa** 0,21 l/ha
Efficacité renforcée grâce à sa phase gazeuse. Délai d'attente 3 semaines.

Oïdium
Effet partiel contre la tavelure

Soufralo 12 kg/ha | **Soufralo** 8–12 kg/ha | **Soufralo** 4,8–8 kg/ha

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).

Poiriers

Débourrement | Préfloraison | Floraison | Postfloraison | Eté | Récolte

Traitements spéciaux

Flétrissement bactérien	**Alial 80 WG** 4,8 kg/ha	Effet partiel.
Feu bactérien	**Vacciplant** 0,75 l/ha	Effet partiel.
	Appliquer à chaque traitement du stade boutons verts jusqu'à fin floraison.	
	Contre les infections secondaires. 1re applications au stade pousses de 2–5 cm. 2e application 3–5 semaines plus tard. **Regalis Plus** 2,5 kg/ha/année	
	Lors d'application unique max. 2,5 kg/ha entre le début floraison et fin floraison ou max. 1,5 kg/ha entre la postfloraison et jusqu'à ce que le calibre du fruit atteint 50 %.	Ne pas mélanger avec d'autres produits d'éclaircissage ainsi qu'avec des engrais contenant du calcium. A intervalles de 2–3 jours.
Régulateur de croissance	**Regalis Plus** 2,5 kg/ha/année	
Pourriture de l'œil, moniliose, tavelure	Max. 3 applications/année. Avant, pendant et après la fleur. **Frupica SC** 0,48 l/ha	**+ Atollan** 0,48 kg/ha ou **Captan S WG** 1,6 kg/ha
Efficacité partielle Tavelure et oïdium	**Armicarb** 0,2–0,3 % (3–4,8 kg/ha) **+ Soufralo** 0,2 % (3,2 kg/ha)	
	Efficacité partielle contre la tavelure et la maladie de la suie.	Délai d'attente: 8 jours.
Maladie de conservation	Préventivement tous les 10–14 jours. Délai d'attente 3 semaines.	2,4 kg/ha **Captan S WG**
Oïdium, tavelure	Effet partiel. **Vacciplant** 1 l/ha	
	Applications à intervalles de 7–10 jours.	Délai d'attente: 3 jours.
Améliore la nouaison des poires Williams	**Falgro Tabs** 1 Tab./100 l d'eau	
Soutien de la croissance et de la santé du feuillage	**Vitex Plus** 1 l/ha **+ Vitex Verde** 1 l/ha	

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).