Poiriers

	Débourrement	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Eté	Récolte

Ravageurs

Psylle du poirier	**Surround** 32 kg/ha + **Sticker** 0,1 %	Appliquer Surround au début d'un vol en février/mars quand la température s'élève à plus de 10 °C. Appliquer de janvier à mars 2–3 × jusqu'à la floraison.
	TAK 50 EG 0,48 kg/ha	Appliquer TAK 50 EG en février/mars quand la température est supérieure à 10 °C pendant 2 jours de suite (autorisation spéciale).
	Armicarb 5 kg/ha L'ajout d'Anti-Mousse S réduit la formation de mousse.	
Cochenille diaspine, cheimatobie, ériophyide gallicole, cochenille lécanine, acarien rouge	**Zofal D** 56 l/ha oder Zofal R 2 % 30–40 l/ha. Stade B–C.	A partir de 10 °C. Ne pas appliquer en cas de risque de gel. Dosage avec le Gun 2,5–3,5 l/100 l d'eau (2,5–3,5 %). Miscible avec Cupric Flow, Kocide 2000 ou Oxycuivre 35. Ne pas mélanger avec Atollan.
Acarien rouge	**Zofal D** 32 l/ha Stade D.	
	Zofal D 16 l/ha Stade E.	
Pucerons du feuillage	**Gazelle SG** 240 g/ha **Gazelle SG** 240 g/ha 160 g/ha (dès juillet) Avant ou après la floraison. Dosage dès juillet 160 g/ha. Gazelle SG: max. 1 application sur les mêmes variétés de pucerons. Max. 2 applications/culture/année.	
Puceron du feuillage Effet partiel sur la cochenille virgule	Pour augmenter l'efficacité, ajouter **0,15 l/ha de Sticker.** Appliquer sur les jeunes larves de la cochenille virgule. Max. 2 applications par culture/année. PER: 1 application par variété de pucerons. **Pirimor** 640 g/ha 320 g/ha (dès juillet)	
Cheimatobie, noctuelle	**Atac** 0,2 % (3,2 kg/ha) ou Elvis 0,32 l/ha **Atac** 3,2 kg/ha	
Cheimatobies, hyponomeutes et tordeuse de la pelure	**Wormox** 0,8–1 kg/ha **Wormox** 0,8–1 kg/ha	
Carpocapse, tordeuse de la pelure et petite tordeuse des fruits	**Atac** 3,2 kg/ha **Atac** 3,2 kg/ha **Atac** 3,2 kg/ha Seulement dans les vergers. Délai d'attente: 3 semaines. Max. 2 applications. **Elvis** 0,32 l/ha **Elvis** 0,32 l/ha **Elvis** 0,32 l/ha	
Punaises des fruits	**Elvis** 0,32 l/ha **Elvis** 0,32 l/ha	

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).

Poiriers

	Débourrement	Préfloraison	Floraison	Postfloraison	Eté	Récolte

Ravageurs

Acarien rouge			**Nissostar** 0,32 l/ha	**Nissostar** 0,32 l/ha	Env. 14 jours après la floraison. Au plus tard jusqu'à fin juin.	
	Sur les œufs d'hiver avant la floraison, sur les œufs d'été fin floraison. Max. 1 × par année.					
	Appliquer immédiatement ou env. 3 semaines après la floraison sur les stades mobiles. Pour une bonne mouillabilité, ajouter 0,15 l/ha de Sticker.			**Kanemite** 1,8 l/ha	Max. 1 application par parcelle et année.	
Eriophyide libre (effet partiel)	12 kg/ha **Soufralo** 8 kg/ha			**Soufralo** 4,8–8 kg/ha		
Pucerons du feuillage et acariens		**Oleate 20** 10–15 l/ha		**Oleate 20** 10–15 l/ha		
				Délai d'attente: 3 semaines.		
Phytopte du poirier					(Application après la récolte)	32 kg/ha **Soufralo**
Hoplocampe	Postfloral. Gazelle SG: max. 2 applications/culture/année.			**Gazelle SG** 240 g/ha		
Carpocapse Confusion	**CheckMate** Dispenser Arbo CM-XL 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha					
	Mise en place fin mars. Le nombre de dispensers ou de puffers est calculé en fonction de la surface du verger. En cas de doute, prendre contact avec notre service externe. Condition: attaque faible lors de l'année précédente (pas plus de 1–2 %).					
	CheckMate Puffer Arbo CM 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha					
Confusion sexuelle contre le carpocapse et la tordeuse de la pelure	**CheckMate** Leaf Multi 2–3 Puffer/ha ou 300–400 Dispenser/ha					
Carpocapse, tordeuse orientale du pêcher	Au moins 3 applications de 1 l/ha chacune. Idéal lors d'attaque tardive. Durée d'efficacité 12 jours. A conserver au frais à env. 5 °C. + Lufix 2 l/ha (protection contre les UV).			**Carpovirusine Evo2** 1 l/ha		
				Délai d'attente: 1 semaine.		

Tous les dosages sont basés sur un volume d'arbres de 10 000 m³ par ha (1600 l/ha).