

# Cerisiers/ Pruniers



Débourrement

Préfloraison

Floraison

Postfloraison

Eté

Récolte

## Maladies

Maladie criblée	<b>Kocide 2000</b> 4–6 kg/ha	ou <b>Oxycuivre 35</b> 4–6 kg/ha. Max. 4 kg/ha de cuivre métal/année.	
	<b>Bordeaux S</b> 8–12 kg/ha		
	<b>Atollan</b> 0,8 kg/ha		
	Ne pas appliquer plus que 2,4 kg/ha d'Atollan par parcelle par année.		
	<b>Captan S WG</b> 2,4 kg/ha		
	<b>Folpet 80 WDG</b> 2,5 kg/ha		
	<b>Slick</b> 0,32 l/ha + <b>Atollan</b> 0,48 kg/ha ou <b>Captan S WG</b> 1,6 kg/ha		
	<b>Amistar</b> 1,6 l/ha	Au plus tard jusqu'à fin floraison.	
Maladie des pochettes (prunier)	<b>Kocide 2000</b> 6 kg/ha ou <b>Oxycuivre 35</b> 6 kg/ha		
	<b>Bordeaux S</b> 8–12 kg/ha ou <b>Cupric Flow</b> 8–12 l/ha		
	<b>Atollan</b> 0,8 kg/ha		
	Ne pas appliquer plus que 2,4 kg/ha d'Atollan par parcelle par année.		
Moniliose, maladie criblée, pourriture amère (cerises, pruneaux)	Max. 4 applications par année.	<b>Slick</b> 0,32 l/ha + <b>Atollan</b> 0,48 kg/ha	ou <b>Captan S WG</b> 1,6 kg/ha
	Max. 3 applications par année.	<b>Amistar</b> 1,6 l/ha	
	Seulement sur les cerisiers!	<b>Fezan</b> 0,48 l/ha	
	Seulement sur les pruniers!	<b>Avatar</b> 1 kg/ha	
	Seulement sur les cerisiers! Spécialement pour les cultures biologiques.	<b>Armcarb</b> 3–4,8 kg/ha + <b>Soufralo</b> 3,2 kg/ha	
	L'ajout d'Anti-Mousse S réduit la formation de mousse.		



## Cerisiers/ Pruniers

Débourrement

Préfloraison

Floraison

Postfloraison

Eté

Récolte

### Maladies (suite)

Pourriture amère, maladie criblée	Jusqu'à fin floraison.	<b>Amistar</b> 1,6 l/ha	
	Ne pas appliquer plus que 2,4 kg/ha d'Atollan par parcelle par année.		<b>Atollan</b> 0,8 kg/ha
Anthracnose (cerises)	Traiter dès les premières taches. En cas de fortes attaques, répéter les traitements à intervalles de 2–3 semaines.		<b>Atollan</b> 0,8 kg/ha
			<b>Captan S WG</b> 2,4 kg/ha
			<b>Folpet 80 WDG</b> 2 kg/ha
Chancre bactérien (cerises)	A la chute des feuilles.	ou <b>Oxycuivre 35</b> 6,9 kg/ha ou <b>Cupric Flow</b> 8–12 l/ha	<b>Kocide 2000</b> 6,4 kg/ha
			<b>Bordeaux S</b> 8–12 kg/ha
Rouille du prunier	1 × entre mi-juin et fin juin, 1 × entre mi-juillet et fin juillet.		<b>Atollan</b> 0,8 kg/ha
Rouille du prunier (efficacité partielle), maladie criblée et ériophyide libre		<b>Soufralo</b> 8–12 kg/ha	<b>Soufralo</b> 4,8–8 kg/ha
	En PER: 4–5 applications de 4–5 kg/ha/année.		