



Tabac

Avant plantation	Après plantation	Formation des racines	4–6 feuilles	6–8 feuilles	Développement des feuilles
------------------	------------------	-----------------------	--------------	--------------	----------------------------

Désherbage

Traitement avant la plantation	Devrinol Plus 3 l/ha	Appliquer avant la plantation sur un sol bien préparé et incorporer légèrement.			
Traitement après la plantation	Devrinol Top 2,5 l/ha ou Cargon S 0,25 l/ha	Appliquer tout de suite après la plantation.			
Graminées levées	Select 0,5 l/ha				

Ravageurs

Limaces	Métarex INOV 5 kg/ha ou Ironmax Pro 7 kg/ha	Protège le tabac contre les limaces.			
Pucerons et mouches blanches	Gazelle SG 250–500 g/ha				
Noctuelles	Wormox 1 kg/ha				

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur	Radi S 1 dl/100 l d'eau	Production de jeunes plants dans les bacs d'eau. Stimule le développement des racines ainsi que l'absorption active des éléments nutritifs. Meilleure reprise après la plantation.			
	Favorise une croissance régulière et rapide des feuilles.	Naturamin WSP 0,5 kg/ha			
Stimule la plante par les feuilles et le sol	A appliquer lors de symptômes de carence.	Triagol 2,5 l/ha			

Riz semis sur terrain sec

Présemis	1 feuille	Fin tallage	Début élongation	Dernière feuille étalée	Epiaison
----------	-----------	-------------	------------------	-------------------------	----------

Désherbage

En prélevée	Cargon S + Sitradol Tec 0,25 l/ha + 3 l/ha				
En postlevée	Pedian SG 1 kg/ha	Au stade 2–4 feuilles des mauvaises herbes.			

Maladies

Helminthosporiose du riz, pyriculariose du riz	Amistar 1 l/ha	Délai d'attente: 28 jours			
--	-----------------------	---------------------------	--	--	--

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.