

Salades

Plantation	5–6 feuilles	8 feuilles	10 feuilles	Avant la formation de la tête	Formation de la tête

Désherbage

	Nizo S 2,5–3,75 l/ha	Avant la plantation 3,5 l/ha de Nizo S + 3 l/ha de Sitradol Tec ou immédiatement après la plantation 2,5–3,75 l/ha de Nizo S. Arroser légèrement (min. 15 mm).

Maladies

Mildiou, pourriture et botrytis (efficacité partielle)	**Amistar** 1 l/ha	Ne pas appliquer dans les cultures couvertes de novembre à mars. Délai d'attente: 14 jours.
Mildiou Pommées, endives, laitue, chicorée	**Stamina S** 3 l/ha	3 applications/année à intervalles de 7–10 jours. Délai d'attente: 14 jours.
Mildiou (efficacité partielle)	**Vacciplant** 1 l/ha	Miscible avec Amistar. Délai d'attente: 3 jours.
Anthracnose de la laitue	**Slick** 0,5 l/ha	Au début d'une attaque, max. 4 applications. Observer la résistance des variétés. Délai d'attente: 21 jours.
Botrytis, sclerotinia, rhizoctonia	**Avatar** 0,6 kg/ha	1re application 3–5 jours après la plantation. 2e application après 10–14 jours. Max. 2 applications par parcelle, par année.

Ravageurs

Puceron des racines	Délai d'attente: 6 semaines.	**Pirimor** 0,1 % (5 g/m²) Sous serre de juin jusqu'à août. Seulement dans la production de plantons.
Puceron du feuillage	Délai d'attente: 14 jours.	**Gazelle SG** 0,15 kg/ha
	Délai d'attente: 7 jours	**Sicid Neem** 1,5 l/ha
Puceron du feuillage, noctuelle, mouche mineuse, thrips	Délai d'attente: 7 jours.	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha
Noctuelles terricoles, noctuelles, thrips	Délai d'attente: 7 jours.	**Elvis** 0,2 l/ha
Noctuelles terricoles	Délai d'attente: 14 jours.	**Deltastar** 0,5 l/ha

Favorise la nutrition

Nécrose des feuilles	**Calshine** 2 × 2,5 l/ha