Concombres

en serre

Plantation | 2–4 feuilles | 8–10 feuilles | Floraison | Début récolte

Maladies

Oïdium, mildiou	2–3 applications pendant 7 jours.	**Amistar** 1 l/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Taches angulaires, mildiou	Attention lors de dosages élevés.	**Kocide 2000** 2 kg/ha	Délai d'attente: 21 jours.
Oïdium		**Armicarb** 3 kg/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Mildiou		**Vacciplant** 3 l/ha	Délai d'attente: 3 jours.
		Stamina S 0,35 %, (3,5 l/ha)	En cas de forte pression. Délai d'attente: 15 jours.
Gommose	Max. 4 applications/ année.	**Slick** 0,5 l/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Botrytis, sclerotinia		**Avatar** 0,1 % (1 kg/ha)	Délai d'attente: 3 jours.

Ravageurs

Puceron du feuillage		**Gazelle SG** 0,25 kg/ha	Délai d'attente: 3 jours.
	En cultures couvertes: 0,25 % à intervalles de 7–14 jours.		
		TAK 50 EG 0,2 kg/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Thrips, mouche blanche		**Gazelle SG** 0,5 kg/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Acarien tétranyque		**Kanemite** 0,1 % ou **Nissostar** 0,032 %	Délai d'attente: 3 jours.
	Efficacité: Kanemite contre les adultes, Nissostar contre les œufs et les nymphes.		
Thrips, noctuelles		**Elvis** 0,3–0,4 l/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Mouche blanche		**Deltastar** 0,5 l/ha	Délai d'attente: 3 jours.

Pour une nutrition optimale

Santé du feuillage		**Green On Micro** 0,5 kg/ha	Délai d'attente: 3 jours.