Tomates

		Plantation	1re grappe	2e grappe	3e grappe	Récolte
Maladies						
Alternariose, mildiou de la tomate, septoriose, pseudomonas	Applications dès début floraison. Délai d'attente: 21 jours.	**Kocide 2000** 1,5–2 kg/ha				
Alternariose, mildiou de la tomate, oïdium	Observer la résistance des variétés et des mélanges. Délai d'attente: 3 jours.	**Amistar** 1 l/ha				
Alternariose, oïdium, septoriose	Délai d'attente: 3 jours.	**Slick** 0,5 l/ha				
Oïdium		**Soufralo** 1–2 kg/ha				
		Armicarb 3 kg/ha				
	Bonne efficacité stoppante. Autorisé en culture bio. Délai d'attente: 3 jours.					
Moucheture bactérienne, oïdium, pourriture grise	Délai d'attente: 3 jours.	**Vacciplant** 1 l/ha				
Botrytis	Délai d'attente: 3 jours.	**Avatar** 0,1 %				
Ravageurs						
Puceron du feuillage	Délai d'attente: 7 jours.	**Pirimor** 0,05 %				
	Délai d'attente: 3 jours.	**TAK 50 EG** 0,02 %				
	Délai d'attente: 3 jours. Uniquement sous serre.	**Gazelle SG** 0,025 %				
Puceron du feuillage et mouche blanche	Délai d'attente: 3 jours.	**Sicid Neem** 0,15 %				
Mouche blanche	Délai d'attente: 3 jours.	**Deltastar** 0,05 %				
Mouche blanche	Délai d'attente: 3 jours.	**Gazelle SG** 0,05 %				
Acarien tétranyque	Délai d'attente: 3 jours.	**Nissostar** 0,04 % ou **Kanemite** 0,1 %				
	Efficacité: Nissostar au début de l'attaque (contre les œufs et les nymphes). Kanemite contre les adultes.					
Thrips, noctuelles, teigne de la tomate	Délai d'attente: 3 jours.	**Elvis** 0,03–0,04 % (0,3–0,4 l/ha)				
	Délai d'attente: 2 jours.	**Wormox** 1 kg/ha (0,1 %)				
Mouches mineuses	Délai d'attente: 3 jours.	**Elvis** 0,04–0,08 % (0,4–0,8 l/ha)				
Pour une nutrition optimale						
Physio-activateur		**Goëmar Start** 2 l/ha				
Fatigue des racines				**Radi S** 5 × 2 l/ha		
	Réduit la fatigue des racines dans les cultures sur substrat et active le métabolisme. Miscible avec les produits physio-activateurs.					
Approvisionnement en Ca		**Calshine** 2,5 l/ha				
	Prévenir la pourriture des fleurs.					
Santé du feuillage		**Green On Micro** 0,5 kg/ha				