Soja

	Postsemis	2–4 feuilles	2 nœuds	Préfloraison	Floraison
Désherbage					
Traitement en postsemis	**Cargon S** 0,25 l/ha **+ Mazil** 1–1,4 l/ha ou **Colzaphen** 3 l/ha	Traiter de suite au plus tard 3 jours après le semis. Ne pas traiter sur sols sablonneux et filtrants. Les semences doivent être totalement recouvertes de terre.			
Traitement en postlevée		**Pedian SG** 0,5 kg/ha **+ Berone** 0,5 l/ha	Répéter l'application après 5–9 jours.		
Graminées levées		**Select** 0,5–1 l/ha **+ Xenturion** 1 l/ha			
Ravageurs					
Limaces	**Métarex INOV** 5 kg/ha ou **Ironmax Pro** 7 kg/ha	Répéter l'application selon les conditions et la population de limaces.			
Pour une nutrition optimale					
Physio-activateur			**Goëmar Multi** 3 l/ha		Pour une bonne fécondation.
Fumure foliaire d'appoint			**Vitaly** 2 l/ha **+ Sulfo S** ou **Prosulf** 3 l/ha		

Lupin

	Prélevée	1–2 feuilles	Croissance en volume	Floraison
Désherbage				
Application après semis	**Cargon S** 0,3 l/ha **+ Golaprex Basic** 5 l/ha	Jusqu'à 5 jours après le semis.		
Maladies				
Anthracnose	Pleine floraison.			**Amistar** 0,8 l/ha Délai d'attente: 42 jours.

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.