

Haricots

Semis | Cotylédons | 2–4 feuilles | 6 feuilles | Préfloraison | Floraison

Désherbage

Traitement prélevée	**Cargon S** 0,25 l/ha **+ Successor 600** 2 l/ha	Immédiatement après le semis (jusqu'à 3 jours après).			
	Colzaphen 3 l/ha				
Postlevée	Au stade cotylédons des haricots: 1 kg/ha Pedian SG + 1 l/ha Bolero.		**Pedian SG** 0,5–0,8 kg/ha		
Graminées levées	Très bonne efficacité contre les pâturins. Dernière application: avant la floraison.		**Select** 0,5–1 l/ha **+ Zofal R** 1 l/ha		
			Xenturion 1–3 l/ha		

Maladies

Botrytis, anthracnose, sclérotiniose, mildiou			**Amistar** 1 l/ha		
	Application préventive, max. 3 applications/an. Délai d'attente: 14 jours. Avant la floraison.				
Brûlure bactérienne, graisse du haricot			Délai d'attente: 21 jours.	**Kocide 2000** 2 kg/ha	
Botrytis, sclérotiniose	1re application pleine floraison.		Délai d'attente: 14 jours.	**Avatar** 0,8 kg/ha	
	Application de suite lors de forte pression de maladie, en pleine floraison.		Délai d'attente: 21 jours.	**Fezan** 1 l/ha	
				Renforce la tige.	

Ravageurs

Noctuelle, puceron du feuillage		**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha	Délai d'attente: 7 jours.
Pyrale des haricots	Délai d'attente: 14 jours.	**Deltastar** 0,3 l/ha	
Puceron du feuillage		**Pirimor** 0,5 kg/ha	Délai d'attente: 7 jours.
Noctuelles		**Wormox** 1 kg/ha	Délai d'attente: 2 jours.

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur	Favorise une floraison régulière.	**Goëmar Start** 2 l/ha	
		Vitaly 3 × 2 l/ha	