Carottes

Semis	2 feuilles	4 feuilles	8–10 feuilles	3 semaines avant la récolte

Désherbage

Avant le travail du sol	**Roundup PowerMax** 2–4 l/ha	Pour éliminer les mauvaises herbes présentes avant le travail du sol. Résistance au lessivage (1 heure). Délai d'attente de 6 heures jusqu'au travail du sol pour les mauvaises herbes annuelles.	
Prélevée	**Reglone** 3 l/ha	Pour brûler des mauvaises herbes avant la levée de la culture.	
	Cargon S 0,25 l/ha **+ Sitradol Micro** 1–2,5 l/ha **+ Dancor 70 WG** 100 g/ha	Sur sols mi-lourds à lourds. Appliquer immédiatement après le semis. Contre les mauvaises herbes levées en postlevée 2 × 1,5 l/ha de Sitradol SC / Micro. **(Cargon S: l'unique produit avec bonne efficacité contre les morelles noires.)**	
	ou		
	Cargon S 0,2 l/ha **+ Dancor 70 WG** 100 g/ha	Sur sols légers et sableux.	
Le standard en postlevée	En application fractionnée, répéter après 8 jours. Adapter le dosage selon le stade de la culture. Dancor 70 WG max. 300 g/ha par culture.	**Dancor 70 WG** 100 g/ha **+ Dacthal SC** 0,5 l/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha	Dacthal SC: Délai d'attente: 70 jours.
Repousses de céréales, pâturins, millets et autres graminées	Très bonne efficacité contre les pâturins.	**Select** 0,5–1 l/ha	Délai d'attente: 8 semaines.

Maladies

Alternariose de la carotte	Application préventive, max. 3 ×/année. Action stimulante de la plante.	**Amistar** 1 l/ha	
	Traitement de suite après Amistar alternativement (max. 3 applications/année).		
	Délai d'attente: 21 jours. 3 applications/année.	**Fezan** 0,6 l/ha	
	Délai d'attente: 14 jours. 4 applications/année.	**Slick** 0,5 l/ha	
	En mélange 1 kg/ha. Appliquer pour stopper une forte attaque.	**Kocide 2000** 5–7 kg/ha	Délai d'attente: 21 jours.

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra.