Carottes

	Semis	2 feuilles	4 feuilles	8–10 feuilles	3 semaines avant la récolte

Ravageurs

Psylle de la carotte, noctuelles terricoles		**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Pucerons des feuillage	Délai d'attente: 7 jours.	**Deltastar** 0,3 l/ha **+ Pirimor** 500 g/ha	
Psylle de la carotte, mouche de la carotte	Délai d'attente: 14 jours.	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha	
	Contrôler les attaques avec les panneaux englués jaunes. Application au début des vols, répéter tous les 7 jours. Pendant le vol principal, appliquer entre 16 h et 20 h.		
		Deltastar 0,5 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Noctuelle terricole		**Deltastar** 1 l/ha	Délai d'attente: 28 jours.
Préventif et répulsif contre la mouche de la carotte	**Karma** 6–8 diffuseurs/ha		

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur	Assure l'absorption de Ca lors de conditions sèches.	**Radi S** 3 l/ha	
	En mélange avec les premières applications fongicides.	**Goëmar Start** 2 l/ha	
	Pour une croissance régulière et un rendement élevé.	**Sulfo S** 4 l/ha	
		Green On Micro 0,5 kg/ha	Lors de carence en manganèse.
Pour une nutrition suffisance en Ca	Evite les fissures lors d'une forte croissance.	**Calshine** 2×2,5 l/ha	
Activateur de plante et du sol	**Triagol** 3 l/ha		
	Miscible avec les herbicides et les fongicides.		