Epinards

	Prélevée	Cotylédons	2–3 feuilles
Désherbage			
Immédiatement après le semis	**Cargon S** 0,15 l/ha + **Venzar 500 SC** 1 l/ha	Désherbage sûr dans les cultures d'épinard. Cargon S peut provoquer des chloroses persistantes et une diminution de croissance sur les feuilles d'épinard.	
Postlevée		**Beetup 160 EC** 0,5–1 l/ha	Traitements split de suite au stade cotylédons. Répéter après 5–7 jours. Dès le stade 2–3 feuilles, utiliser une dose réduite (danger de phytotoxicité). Evtl. se renseigner au préalable.
Ravageurs			
Pucerons	Délai d'attente: 1 semaine.	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha	
Thrips, mouches mineuses, noctuelles		**Elvis** 0,2 l/ha	
Noctuelle terricole	Délai d'attente: 14 jours.	**Deltastar** 0,3 l/ha	
Noctuelles	Délai d'attente: 2 jours.	**Wormox** 1 kg/ha (0,1 %)	
Pour une nutrition optimale			
Physio-activateur			**Goëmar Start** 2,5 l/ha

Scorsonères

	Semis	2 feuilles	6 feuilles	8 feuilles	10 feuilles
Désherbage					
Prélevée	**Cargon S** 0,15 l/ha + **Sitradol Tec** 2,5 l/ha	Immédiatement après le semis. Délai d'attente: 90 jours.			
	Sitradol Tec 2,5 l/ha	Jusqu'à 5 jours après le semis.			
	Venzar 500 SC 2,5 l/ha	Au plus tard 3 jours après le semis.			
Maladies					
Rouille blanche		**Kocide 2000** 5 kg/ha			
Ravageurs					
Puceron du feuillage, noctuelle terricole, mouche mineuse, thrips	Délai d'attente: 14 jours.	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha			
Noctuelle terricole	Délai d'attente: 14 jours.	**Deltastar** 0,5 l/ha			

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.