Pois

	Postsemis	2–4 feuilles	6 feuilles	Préfloraison	Floraison

Désherbage

En prélevée	**Dacthal SC** 3 l/ha + **Successor 600** 2 l/ha ou **Colzaphen** 3 l/ha	Application au max. 3 jours après le semis. Ne pas traiter sur des sols sablonneux et filtrants. Les semences doivent être complètement recouvertes de terre. Un sol humide favorise l'efficacité.
Postlevée	**Berone** 1 l/ha + **Pedian SG** 1 kg/ha A partir du stade 2 feuilles des pois. Evtl. en application fractionnée (2× Berone 0,5 l/ha + Pedian SG 0,5 kg/ha). Meilleure efficacité en mélange avec Sitradol Tec 1 l/ha en application fractionnée.	
Traitement de correction	**Trifoline** 4 l/ha	Traitement de correction contre adventices sensibles aux hormones. Efficace seulement sur petites adventices.
Graminées levées	**Select** 0,5 l/ha + **Xenturion** 1 l/ha	

Maladies

Anthracnose, botrytis et mildiou	Observer les variétés sujettes et les premiers symptômes. Miscible avec nos aphicides.	**Amistar** 1 l/ha ou **Fezan** 1 l/ha

Ravageurs

Limaces	**Métarex INOV** 5 kg/ha ou **Ironmax Pro** 7 kg/ha	Selon la météo et la population de limaces, répéter les applications.
Tordeuse du pois	**Atac** 1,5 kg/ha ou **Deltastar** 0,3 l/ha	
Sitones du pois	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha	
Pucerons	Au début d'une attaque, avant la floraison, possible en mélange avec nos fongicides.	**Pirimor** 150 g/ha

Pour une nutrition optimale

Activateur de la plante et du sol	**Triagol** 2,5 l/ha ou **Naturamin WSP** 0,5 kg/ha	
Physio-activateur	**Goëmar Multi** 3 l/ha	Favorise une floraison régulière.
Evite les accidents de floraison	**Vitaly** 2 l/ha	