Betteraves à salade

Cotylédons	2 feuilles	4 feuilles	6–8 feuilles	Fermeture des lignes	Juillet jusqu'à septembre

Désherbage

Mauvaises herbes annuelles	**Bettix SC** 1,5–2 l/ha **+ Beetup Duo** 1–1,5 l/ha 2–4 applications en traitement split sur les mauvaises herbes levées. Quantité totale d'herbicides: 4–5 l/ha.	
Partenaire de mélange Pour soutenir l'effet foliaire	**Debut** 3 × 20 g/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha Amarantes, repousses de colza (brassicacées), mercuriale, éthuse, camomille, gaillet, tournesol, liserons. Répéter à intervalles réguliers (dosage total: 60 g/ha).	
	Venzar 500 SC 100–200 g/ha Amarantes, chénopodes et renouées.	
Traitement de correction en dosage unique	**2 × Debut** 30 g/ha **+ Gondor** 0,5 l/ha Contre les mauvaises herbes à larges feuilles (amarantes, faux persil, camomille, gaillet gratteron, liseron). Répéter les applications après 8 jours.	
Mauvaises herbes annuelles	**Select** 0,5–1 l/ha **+ Zofal R** 1 l/ha Millets, vulpins des champs, ray-grass, pâturins, agrostide jouet du vent. Idéal en traitement final.	Délai d'attente: 60 jours.
	Xenturion 1–3 l/ha	

Maladies

Cercosporiose et ramulariose	Application préventive à l'apparition des premières taches. Max. 2 traitements par saison.	Délai d'attente: 11 jours	**Amistar** 1 l/ha
	Max. 3 traitements par saison.	Délai d'attente: 14 jours.	**Slick** 0,5 l/ha
		Délai d'attente: 21 jours.	**Kocide 2000** 2 kg/ha

Ravageurs

Altise, mouche mineuse	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha	Délai d'attente: 7 jours.
Noctuelle terricole	**Deltastar** 0,5 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Puceron du feuillage	**Pirimor** 0,5 kg/ha	Délai d'attente: 7 jours.

Favorise la nutrition

Physio-activateur	2–3 applications en mélange avec les fongicides et insecticides.	**Goëmar Multi** 3 l/ha
	Réduit le stress dû aux herbicides.	**Triagol** 3 l/ha