# Tournesol

| | Présemis | Postsemis | Germination | Développement des feuilles | Développement des fleurs |
|---|---|---|---|---|---|

## Désherbage

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Application avant semis | **Calado** 2 l/ha | Spécialement contre le souchet comestible. Travailler immédiatement après le traitement. En PER avec autorisation spéciale. | | | |
| Traitement en postsemis | La version top | **Dacthal SC** 2–3 l/ha + **Mazil** 1–1,4 l/ha + **Sitradol Tec** 2 l/ha | Appliquer immédiatement après le semis. Les graines doivent être totalement recouvertes de terre. | | |
| Graminées levées | | | | **Select** 0,5–1 l/ha + **Zofal R** 1 l/ha<br>ou<br>**Xenturion** 1–3 l/ha | |

## Ravageurs

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Limaces | | **Métarex INOV** 5 kg/ha<br>ou<br>**Ironmax Pro** 7 kg/ha | | Les tournesols sont très sujets aux limaces! Répéter l'application selon les conditions. | |

## Pour une nutrition optimale

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Physio-activateur | Pour une bonne fécondation. | | | **Goëmar Multi** 3 l/ha | |
| Fumure foliaire d'appoint | Miscible avec Goëmar. | | | **Engrais liquide S** 4 l/ha | |
| Activateur de la plante et du sol | **Triagol** 2,5 l/ha<br>Miscible avec les herbicides. Ajouter en dernier dans le réservoir. | | | | |

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra oder Vapi Clean.