Chicorée

Semis	Cotylédons	2 feuilles	4 feuilles	6 feuilles	10 feuilles	Formation de la tête	Forçage

Désherbage

Après le semis	**Nizo S** 2,5–3,75 l/ha	Application juste avant la levée. Une légère humidification (min. 15 mm) améliore l'efficacité. Action insuffisante contre les astéracées.
Postlevée	**Debut** 2 × 20–30 g/ha	

Maladies

Oïdium, cladosporiose	**Amistar** 1 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.
Mildiou, phytium	Max. 4 applications/année. **Stamina S** 3,5 l/ha	Délai d'attente: 15 jours.
Alternariose, oïdium, rouille	**Slick** 0,5 l/ha	Délai d'attente: 21 jours.
Sclérotiniose, botrytis	Application: pour le stockage 36 g/t en pulvérisation ou 90 g/hl en trempage. Avant la culture forcée en pulvérisation 4,5 g/m^2. Délai d'attente: 21 jours.	**Avatar** 1 kg/ha

Ravageurs

Puceron du feuillage, thrips, noctuelles terricoles, mouches mineuses	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha		
Noctuelle terricole	Délai d'attente: 14 jours.	**Deltastar** 0,5 l/ha	
Puceron du feuillage	**Pirimor** 0,5 kg/ha		Délai d'attente: 7 jours.
Noctuelles	Délai d'attente: 2 jours.	**Wormox** 1 kg/ha	

Après chaque application herbicide, nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.