

Désherbage

Avant la levée de la culture	Natrel 16 I/ha	Utilisation par temps ensoleillé.
Après le semis	Aprex FL 0,85 l/ha	

Maladies

Oïdium		Slick 0,5 I/ha		
	Immédiatement après la pla	antation jusqu'au stade 4 feuilles. Max. 4 applications/a	année.	Délai d'attente: 21 jours.
		Armicarb 3 kg/ha		
	Appliquer préventivement.			Délai d'attente: 3 jours.
Rhizoctonia		Amistar 1 l/ha		
Botrytis		Avatar 0,6 kg/ha		
	Jusqu'à 14 jours après le se	emis.		Délai d'attente: 35 jours.

Ravageurs

Puceron du feuillage	Délai d'attente: 21 jours.	TAK 50 EG 0,2 kg/ha
Noctuelle terricole	Délai d'attente: 14 jours.	Deltastar 0,5 l/ha
Mouches mineuses	louches mineuses Délai d'attente: 14 jours.	Elvis 0,3 l/ha
Noctuelles	Délai d'attente: 2 jours.	Wormox 1 kg/ha

Pour une nutrition optimale

Physio-activateur	2–3 applications en mélange avec les fongicides et insecticides.	Goëmar Start 21/ha

