



## Fraisiers

Plantation	Débourrement	Premier bourgeon	Pleine floraison	Développement du fruit	Après la récolte
------------	--------------	------------------	------------------	------------------------	------------------

### Désherbage

Avant ou immédiatement après la plantation	<b>Successor 600</b> 2 l/ha	Spécialement contre: camomille, gaillet, ortie royale, lamier pourpre et millet.			
Après la plantation	<b>Aprex FL</b> 2,5 l/ha				
Tôt en postlevée	<b>Beetup 160 EC</b> 1,5–3 l/ha	2 applications à intervalles de 4–8 jours contre les mauvaises herbes fraîchement levées. Sans huile ajoutée.			
4 semaines après la plantation	<b>Devrinol Plus</b> 3–3,5 l/ha	Arroser env. 5 mm. Proscrit sur sols sablonneux et tourbeux.			
Pâturins, millets et autres graminées	<b>Select</b> 0,5–1 l/ha + <b>Zofal R</b> 1 l/ha			<b>Select</b> 0,5–1 l/ha	
	<b>Xenturion</b> 1–3 l/ha			<b>Xenturion</b> 1–3 l/ha	
Très bonne efficacité sur les pâturins. Application avant la floraison ou après la récolte.					
Avant la floraison ou après la récolte		<b>Rapper</b> 167 g/ha			<b>Rapper</b> 167 g/ha
Max. 1 traitement par culture et par année.					

### Maladies

Racine rouge, cœur brun du fraisier	<b>Alial 80 WG</b> 5 kg/ha	En arrosage ou en pulvérisation. Automne: application préventive fin août jusqu'à mi-septembre (temps poussant). Début de végétation: application avant la floraison. Max. 4 applications/année.		idem
	Max. 3 applications.	<b>Stamina S</b> 5 l/ha	En arrosage avant la floraison ou après la récolte.	<b>Stamina S</b> 5 l/ha
Oïdium	<b>Armcarb</b> 3 kg/ha	Appliquer régulièrement à intervalles de 8 jours. Autorisé dans les cultures biologiques et dans les jardins.		Délai d'attente: 3 jours.
	<b>Slick</b> 0,5 l/ha			Délai d'attente: 3 semaines.
	<b>Soufralo</b> 2–4 kg/ha			
Oïdium et effet partiel sur le botrytis		<b>Vacciplant</b> 1 l/ha	Délai d'attente: aucun.	
Oïdium, tache des feuilles, effet partiel sur le botrytis	Max. 3 applications/année.	<b>Amistar</b> 1 l/ha	Délai d'attente: 14 jours.	

Nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.



## Fraisiers

Plantation      Débourrement      Premier bourgeon      Pleine floraison      Développement du fruit      Après la récolte

### Maladies (suite)

Pourriture grise, botrytis	Max. 1 application/année.	<b>Frupica SC</b> 1 l/ha		Délai d'attente: 14 jours.
	Max. 2 applications/année.	<b>Avatar</b> 1 kg/ha		Délai d'attente: 14 jours.
Tache pourpre des feuilles Effet partiel		<b>Kocide 2000</b> 1,5–4 kg/ha	ou <b>Oxycuivre 35</b> 1,5 kg/ha	idem
		<b>Bordeaux S</b> 2,5–7,5 kg/ha		idem
		<b>Cupric Flow</b> 3,5–7,5 l/ha		
Mildiou du fraisier, effet partiel	Max. 3 applications/année.	<b>Stamina S</b> 5 l/ha		Délai d'attente: 21 jours.

### Ravageurs

Anthonome du fraisier, thrips	Non autorisé en PER.	<b>TAK 50 EG</b> 0,2 kg/ha	Délai d'attente: 21 jours.
	ou	<b>Elvis</b> 0,2 l/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Puceron du feuillage et acarien		<b>Oleate 20</b> 10 l/ha	
	Délai d'attente: 7 jours.		
Noctuelles		<b>Wormox</b> 1 kg/ha	
Puceron du feuillage		<b>Pirimor</b> 0,4 kg/ha	Délai d'attente: 21 jours.
Acariens		<b>Nissostar</b> 0,4 l/ha	idem
Drosophile du cerisier			<b>Elvis</b> 0,2 l/ha      Délai d'attente: 3 jours.
Limaces	Pour protéger la récolte des morsures de limaces, répéter évtl. les applications.	<b>Métarex INOV</b> 5 kg/ha	
Appât biologique pour limaces		<b>Ironmax Pro</b> 7 kg/ha	