Fraisiers

	Plantation	Débourrement	Premier bourgeon	Pleine floraison	Développement du fruit	Après la récolte

Maladies (suite)

Pourriture grise, botrytis	Max. 1 application/année.	**Frupica SC** 1 l/ha — Délai d'attente: 14 jours.
	Max. 2 applications/année.	**Avatar** 1 kg/ha — Délai d'attente: 14 jours.
Tache pourpre des feuilles Effet partiel	**Kocide 2000** 1,5–4 kg/ha	idem
	ou **Oxycuivre 35** 1,5 kg/ha	
	Bordeaux S 2,5–7,5 kg/ha	idem
	Cupric Flow 3,5–7,5 l/ha	
Mildiou du fraisier, effet partiel	Max. 3 applications/année.	**Stamina S** 5 l/ha — Délai d'attente: 21 jours.

Ravageurs

Anthonome du fraisier, thrips	Non autorisé en PER.	**TAK 50 EG** 0,2 kg/ha — Délai d'attente: 21 jours.
	ou	
		Elvis 0,2 l/ha — Délai d'attente: 3 jours.
Puceron du feuillage et acarien	**Oleate 20** 10 l/ha	
	Délai d'attente: 7 jours.	
Noctuelles	**Wormox** 1 kg/ha	
Puceron du feuillage	**Pirimor** 0,4 kg/ha	Délai d'attente: 21 jours.
Acariens	**Nissostar** 0,4 l/ha	idem
Drosophile du cerisier	**Elvis** 0,2 l/ha	Délai d'attente: 3 jours.
Limaces	Pour protéger la récolte des morsures de limaces, répéter évtl. les applications.	**Métarex INOV** 5 kg/ha
Appât biologique pour limaces	**Ironmax Pro** 7 kg/ha	