Fraisiers

	Plantation	Débourrement	Premier bourgeon	Pleine floraison	Développement du fruit	Après la récolte
Désherbage						
Avant ou immédiatement après la plantation	**Successor 600** 2 l/ha		Spécialement contre: camomille, gaillet, ortie royale, lamier pourpre et millet.			
Après la plantation	**Aprex FL** 2,5 l/ha					
Tôt en postlevée	**Beetup 160 EC** 1,5–3 l/ha		2 applications à intervalles de 4–8 jours contre les mauvaises herbes fraîchement levées. Sans huile ajoutée.			
4 semaines après la plantation	**Devrinol Plus** 3–3,5 l/ha		Arroser env. 5 mm. Proscrit sur sols sablonneux et tourbeux.			
Pâturins, millets et autres graminées	**Select** 0,5–1 l/ha + **Zofal R** 1 l/ha					**Select** 0,5–1 l/ha
	Xenturion 1–3 l/ha					**Xenturion** 1–3 l/ha
	Très bonne efficacité sur les pâturins. Application avant la floraison ou après la récolte.					
Avant la floraison ou après la récolte		**Rapper** 167 g/ha				**Rapper** 167 g/ha
	Max. 1 traitement par culture et par année.					
Maladies						
Racine rouge, cœur brun du fraisier	**Alial 80 WG** 5 kg/ha		En arrosage ou en pulvérisation. Automne: application préventive fin août jusqu'à mi-septembre (temps poussant). Début de végétation: application avant la floraison. Max. 4 applications/année.			idem
	Max. 3 applications.	**Stamina S** 5 l/ha		En arrosage avant la floraison ou après la récolte.		**Stamina S** 5 l/ha
Oïdium		**Armicarb** 3 kg/ha				Délai d'attente: 3 jours.
	Appliquer régulièrement à intervalles de 8 jours. Autorisé dans les cultures biologiques et dans les jardins.					
		Slick 0,5 l/ha				Délai d'attente: 3 semaines.
		Soufralo 2–4 kg/ha				
Oïdium et effet partiel sur le botrytis		**Vacciplant** 1 l/ha				Délai d'attente: aucun.
Oïdium, tache des feuilles, effet partiel sur le botrytis	Max. 3 applications/ année.	**Amistar** 1 l/ha				Délai d'attente: 14 jours.

Nettoyer le pulvérisateur avec le produit All Clear Extra ou Vapi Clean.