Baies

Framboisiers, mûriers, groseilliers à grappes, cassis

	Débourrement	Croissance	Préfloraison	Pleine floraison	Récolte	Après récolte

Maladies | Framboisier, mûrier

Maladies des rameaux		**Kocide 2000** 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha)				idem
		ou				
		Cupric Flow 5 l/ha		Max. 4 kg de cuivre métal par hectare et année. Baies: délai d'attente: 3 semaines.		**Cupric Flow** 5 l/ha
		Bordeaux S 0,5–1,3 % (5–13 kg/ha)				idem
Maladies des rameaux / effet partiel	Max. 3 applications/année.	**Amistar** 1 l/ha				**Amistar** 1 l/ha
Botrytis	Max. 1 application/année.		**Frupica SC** 1 l/ha			Délai d'attente: 14 jours.
	Max. 2 applications. Myrtilles incl.		**Avatar** 1 kg/ha			Délai d'attente: 14 jours.
Rouille des framboises		**Slick** 0,5 l/ha	Max. 4 applications/année.			**Slick** 0,5 l/ha
Mildiou de la mûre		**Stamina S** 4 l/ha				
Deperissement des racines des framboisiers	**Stamina S** 4 l/ha					idem

Maladies | Groseilliers à grappes

Colletotrichum	**Atollan** 0,75–1 kg/ha		Application uniquement dans les groseilliers jusqu'à floraison.			
	Avatar 1 kg/ha		Max. 2 applications/année.			Délai d'attente: 7 jours.
Colletotrichum et oïdium		**Amistar** 1 l/ha				**Amistar** 1 l/ha
	Max. 3 applications/année.					Délai d'attente: 3 semaines.
Maladie des rameaux et chute prématurée des feuilles du groseillier		**Kocide 2000** 0,15–0,6 % (1,5–6 kg/ha)				idem
		ou				
		Cupric Flow 5 l/ha				**Cupric Flow** 5 l/ha
	Max. 4 kg de cuivre métal par hectare et année. Espèces de Ribes: délai d'attente: 3 semaines.					
		Bordeaux S 0,25–1,3 % (2,5–7,5 kg/ha)				idem
Oïdium		**Slick** 0,5 l/ha	Max. 4 applications/année.			**Slick** 0,5 l/ha
		Armicarb 3–4 kg/ha				Délai d'attente: 3 jours.
	Seulement sur les cassis.					